

بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در تالاب بین‌المللی زریوار توسط پایش ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*)

- عیسی سلگی*: گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر
- صیاد خاتونی: گروه محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور تهران

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۳ تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۳

چکیده

تالاب بین‌المللی زریوار دارای ارزش بوم‌شناختی بالایی بوده و گنجینه ذخایر ژنتیکی است. بنابراین، ارزیابی آلودگی این بوم‌سازگان ضروری است که می‌تواند توسط موجودات آبی نمایه‌زیستی مانند ماهی انجام شود. این پژوهش برای بررسی آلودگی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و روی) در تالاب بین‌المللی زریوار توسط سنجش مقادیر آن‌ها در بافت عضله ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*)، انجام شد. برای این هدف نمونه‌برداری در زمستان ۱۳۹۱ صورت پذیرفت. پس از زیست‌سنجی ۲۰ نمونه ماهی صیده شده، بافت‌های عضله جداسازی شده و آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌ها صورت گرفت. غلظت فلزات سنگین انتخاب شده در بافت عضله توسط روش هضم اسیدی (HNO₃:HClO₄) با کمک دستگاه جذب اتمی مدل HR-CS AAS اندازه‌گیری شد. برای فرآکافت آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. میانگین غلظت عناصر کادمیوم، سرب و روی در عضله کپور معمولی به ترتیب ۰/۴، ۰/۳۳ و ۱۲۷/۵ میکروگرم بر گرم است. یافته‌ها نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین غلظت فلزات در دو جنس نر و ماده وجود ندارد. غلظت فلزات در عضله این گونه زیر حدود پیشنهاد شده توسط سازمان‌های جهانی بود، به‌غیر از کادمیوم که بیش‌تر از حد مجاز NHMRC بود. به‌نظر می‌رسد که رواناب‌های کشاورزی و تخلیه فاضلاب منبع اصلی انسانی ورود این فلزات سنگین سمی در تالاب بین‌المللی زریوار است.

کلمات کلیدی: تالاب بین‌المللی زریوار، کادمیوم، سرب، روی، کپور معمولی (*Cyprinus carpio*)، پایش



مقدمه

تالاب‌ها هم‌چون زمین‌های بینابینی بین سامانه‌های خشکی و آبی هستند که در آن‌ها سفره آب بیش‌تر روی سطح زمین و یا نزدیک به آن بوده و یا زمین‌های پوشیده از آب کم‌عمقی هستند که عمق آب از ۶متر تازش نمی‌کند. تالاب از برجسته‌ترین بوم‌سازگان‌های حیاتی است. این بوم‌سازگان‌ها بخش مهمی از تمدن بشری هستند، بسیاری از نیازهای حیاتی برای زندگی بر روی زمین مانند آب آشامیدنی، تصفیه آب، آب انبار، شارژ آب‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش و تثبیت خط ساحلی (Agarwal, 2008) تنها تعدادی از ویژگی‌های این میراث‌های طبیعی است (Prasad و همکاران، 2002). پاسداشت و نگهداری این بدنه‌های آبی با توجه به رشد تند جمعیت و افزایش فعالیت‌های صنعتی، کاری بسیار دشوار است. کیفیت منابع آب روز به روز با توجه به افزایش مداوم مواد شیمیایی نامطلوب رو به وخامت است. با افزایش نگرانی عمومی در مورد آلودگی محیط زیست پایش، مدیریت و بازسازی آسیب‌های محیط زیستی در این بوم‌سازگان‌ها ناگزیر است. در میان آلاینده‌های گوناگون آلی و معدنی آب، یون‌های فلزی به‌علت ماهیت غیرقابل تجزیه و سمیت، خطرناک و زیان‌آور هستند (Karpagavalli و همکاران، 2012). در درازنای چند دهه گذشته، آلودگی آب‌های شیرین با دامنه گسترده‌ای از آلاینده‌ها به یک زمینه نگران‌کننده بزرگ تبدیل شده است. آلودگی اکوسیستم‌های آبی به فلزات سنگین (هم‌چون تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و غیره) نگرش جهانی ویژه‌ای به‌خود جلب کرده است چرا که نشانه‌های سوء بر موجودات و سلامتی انسان دارند (Palaniappan و Karthikeyan, 2009). فلزات سنگین را، به‌سبب انباشت در بافت‌های موجودات آبی، مهم‌ترین شکل آلودگی در محیط‌های آبی می‌دانند (Ashraf و همکاران، 2006). گرچه فلزات سنگین از اجزای کمیاب طبیعی محیط‌های آبی هستند، اما مقادیر آن‌ها در اثر فعالیت‌های صنعتی، معدن‌کاوی و کشاورزی افزایش یافته است (Al-Weher, 2008). ورود فلزات سنگین به تالاب و یا هر محیط آبی می‌تواند ویژگی‌های بوم‌سازگانی، نوع گونه‌های آبی، میزان تولیدمثل موجودات، پراکنش آن‌ها، بقا و روی هم رفته حیات را به‌سبب سمیت و رفتار انباشت‌پذیری فلزات تغییر دهد (Olaifa و همکاران، 2004b) و حتی دامنه اثرات آن‌ها در زندگی انسان نیز به چشم می‌خورد. موجودات آبی مانند ماهی غلظت فلزات را چند برابر بیش‌تر از مقادیر موجود در آب و یا رسوب در بدن خود انباشت می‌کنند (Olaifa و همکاران، 2004a) هم‌چنین

انباشت فلزات در بافت ماهی وابسته به غلظت، مدت زمان تماس و هم‌چنین عوامل دیگر مانند شوری، دما، سختی و سوخت و ساز بدن موجود است. هنگامی که فلزات سنگین در بدن موجود آبی انباشته می‌شوند توانایی جابجایی به سطوح بالای زنجیره غذایی را دارند. گوشت‌خواران بالای زنجیره غذایی، از جمله انسان، از طریق مواد غذایی آلوده به فلزات سنگین به‌ویژه ماهی مقادیر چند برابر بیش‌تر را دریافت می‌کنند که به‌درستی بزرگ‌نمایی زیستی روی می‌دهد (Nwani و همکاران، 2010). بنابراین، فلزات سنگین به زنجیره غذایی راه یافته و برای سلامتی مصرف‌کنندگان ایجاد تهدید می‌کنند. برخی فلزات سنگین مانند مس، کبالت، روی، آهن و منگنز در مقادیر کم برای فعالیت آنزیمی و بسیاری از فرآیندهای زیستی ضروری هستند ولی فلزات دیگر مانند سرب و کادمیوم نقش زیستی شناخته شده‌ای برای بدن موجودات زنده نداشته و تا جایی که در غلظت‌های کم هم سمی هستند اگرچه فلزات ضروری نیز در غلظت بالا سمی هستند (Sani, 2011). پژوهش‌هایی در داخل و خارج کشور در مورد این گونه انجام شده است که تنها به چند مورد آن‌ها اشاره می‌شود. رحیمی و رئیسی (1387) به تعیین میزان سرب و کادمیوم در گوشت ماهیان از جمله کپور معمولی صید شده تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری پرداختند. هم‌چنین بندانی و همکاران (1389) سطح فلزات سنگینی مانند سرب، کادمیوم، کروم و روی را در بافت عضله و کبد ماهی کپور معمولی سواحل استان گلستان بررسی کردند. Panahandeh و همکاران (2014) مقادیر فلزات سنگین را در آب، رسوب و بافت کپور معمولی تالاب انزلی بررسی کردند. Chi و همکاران (2007) پژوهشی در زمینه انباشت فلزات سنگین در گونه‌های مختلف ماهی و کپور معمولی دریاچه تیهو (چین) انجام دادند. بنابراین، پایش فلزات سنگین در محیط‌های آبی توسط آب، رسوب و زیباگان مهم است. ماهی به‌طور گسترده برای پایش زیستی تغییر در سطوح آلاینده‌های محیطی ناشی از منابع انسانی استفاده شده است چرا که ماهی نقش نخستین سامانه هشدار دهنده را دارد (Wang و همکاران، 2013). بنابراین، گونه‌های ماهی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایه‌ها، در بوم‌سازگان‌های آب شیرین، برای برآورد میزان آلودگی فلزات در نظر گرفته شده‌اند (Hosseini Alhashemi و همکاران، 2012). تالاب زریوار یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شیرین جهان به‌شمار می‌آید. پیدایش دریاچه به دوران سوم زمین‌شناسی برمی‌گردد. وسعت دریاچه زریوار به‌دلیل تغییرات حجم آبی در فصول گوناگون متغیر می‌باشد. دریاچه تالابی زریوار



صورت گرفت (Eboh و همکاران، ۲۰۰۶). تعیین جنسیت از روی گنادها انجام شد. پس از این گام جداسازی بافت‌های عضله توسط تیغه‌ای از جنس استیل ضدزنگ صورت گرفت. کالبدشکافی نمونه‌ها از قسمت بالای بدن ماهی صورت گرفت و برداشت بافت عضله از قسمتی از عضله در بخش بالایی بدن استفاده گردید. نمونه‌های عضله تا انجام آزمایش‌های بعدی در سردخانه در دمای 20°C - نگه‌داری شدند. سپس مقدار ۲۰ الی ۳۰ گرم از عضله آن‌ها را جدا کرده و در آون با دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شد. در این مرحله نمونه‌ها پس از رسیدن به وزن ثابت در هاون چینی تا پودرشدن کامل سائیده و خرد شدند و به میزان ۱ گرم از هر نمونه توسط ترازو وزن شد و به آن‌ها به نسبت ۴:۱ اسیدنیتریک (۶۹ درصد) و اسیدپرکلریک (۶۰ درصد) مرک آلمان اضافه شد. سپس در دستگاه هضم کننده ابتدا در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ ساعت و سپس در دمای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ ساعت عمل هضم صورت گرفت. در مرحله بعد با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره ۴۲ فیلتر شده و حجم محلول صاف شده توسط آب مقطر به ۲۵ میلی‌لیتر رسانیده شد نمونه در این شرایط آماده تزیق به دستگاه جذب اتمی می‌باشد (Yap و همکاران، ۲۰۰۲). هم‌چنین هم‌زمان با نمونه‌های اصلی، برای کنترل خطا نمونه‌های شاهد نیز با هر سری از نمونه‌ها آماده‌سازی شده و نیز همه وسایل و ظروف قبل از انجام آزمایش‌ها با اسیدنیتریک اسیدشویی شدند و پیش از شروع کار به‌خوبی با آب مقطر شستشو داده شدند. سنجش نمونه‌های سرب و کادمیم توسط جذب اتمی به‌روش کوره گرافیتی و برای عنصر روی توسط جذب اتمی به‌روش شعله توسط دستگاه HR-CS AAS انجام شد (Harkabusová و همکاران، ۲۰۱۲).

در این تحقیق داده‌ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. فراکافت آماری یافته‌ها با نرم‌افزار SPSS ویرایش ۲۰ انجام شد. ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته شد که برای این هدف از آزمون شاپیروویک استفاده شد (Maceda-Veiga و همکاران، ۲۰۱۲). سپس آزمون‌های من‌ویتنی-یو و آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون به‌ترتیب برای مقایسه فلزات در دو جنس و همبستگی فلزات با وزن ماهی صورت گرفت (Maceda-Veiga و همکاران، ۲۰۱۲). هم‌چنین برای رسم نمودارها نرم‌افزار اکسل ۲۰۰۷ استفاده شد.


جزو اندک دریاچه‌های آب شیرین ایران، با زیباترین جاذبه‌های گردشگری غرب کشور، به‌شمار می‌آید (ابراهیم‌پور و محمدزاده، ۱۳۹۲). تالاب زریوار از دسته تالاب‌های ارزشمند ثبت شده در کنوانسیون بین‌المللی رامسر است که در غرب ایران و در استان کردستان جاگرفته است. این تالاب به‌سبب شرایط ویژه بوم‌شناسی ارزش ویژه‌ای برخوردار بوده و جایگاه زیست و تولیدمثل بسیاری از گیاهان، ماهی‌ها (جدول ۱) و پرندگان می‌باشد. داده‌های کمی در مورد سطوح آلاینده‌ها در گونه‌های ماهی آب شیرین به‌ویژه برای دریاچه زریوار وجود دارد. یافته‌های این پژوهش داده‌هایی در زمینه سطوح پایه فلزات در گونه کپور معمولی این تالاب فراهم می‌آورد که به پیش کیفیت محیط زیست و سلامت موجودات زنده ساکن اکوسیستم تالاب کمک می‌کند.

مواد و روش‌ها

این دریاچه با ارتفاع ۱۳۹۰ متر از سطح دریا، در ۳ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان مریوان استان کردستان در بین طول شرقی ۴۶ درجه و ۳ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۱۰ دقیقه و عرض شمالی ۳۵ درجه و ۳۰ دقیقه و ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه جاگرفته است (ابراهیم‌پور و محمدزاده، ۱۳۹۲). زمین‌شناسی منطقه بیش‌تر سنگ‌های آهکی دگرگونی شده بوده و دریاچه به‌همراه رشته کوه‌های پوشیده از درختان بلوط پیرامون آن در زون سنج -سیرجان، بین رشته کوه‌های زاگرس شمال‌غرب ایران، قرار می‌گیرد. دریاچه زریوار بر روی رسوبات کواترنری قرار گرفته و بیش‌ترین عمق آن ۷ متر و میانگین عمق آن ۳ متر می‌باشد. در نهایت تالاب زریوار با بخشی از جنگل‌های زاگرس شمالی است که نه تنها از دیدگاه حفاظت آب و خاک، جلوگیری از فرسایش و ایجاد آب و هوای مناسب دارای ارزش بالایی است بلکه به‌علت وجود جاذبه آبی دریاچه زریوار و نزدیکی با مرز باشماق، زریوار از نظر اکوتوریسم نیز بسیار چشمگیر است (رشیدی و همکاران، ۱۳۸۹) (شکل ۱).

در این پژوهش ۲۰ نمونه ماهی (۱۱ نر و ۹ ماده) کپور معمولی (*cyprinus carpio*) در فصل زمستان ۱۳۹۱ از تالاب زریوار به شیوه تصادفی و در اندازه‌های تصادفی توسط صیادان محلی به‌وسیله تورهای سنتی صید شد. نمونه‌ها در ظروف پلاستیکی حاوی یخ به آزمایشگاه محیط زیست دانشگاه ملایر منتقل شدند. سپس در آزمایشگاه نمونه‌های ماهی چند بار با آب دیونیزه برای زدودن آلودگی‌های خارجی شسته شدند. پس از گذشت زمان و خروج آب اضافی نمونه‌ها، زیست‌سنجی آن‌ها





شکل ۱: نقشه منطقه مورد مطالعه

نتایج

من ویتنی-یو برای عنصر روی و آزمون تی مستقل برای عناصر سرب و کادمیوم صورت گرفت. هدف از این آزمون مقایسه میانگین عنصر روی، سرب و کادمیوم بین دو جنس نر و ماده کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) تالاب زیروار بود که یافته‌های آن در اشکال ۲ و ۳ آمده است. باتوجه به این شکل‌ها هیچ‌گونه تفاوت آماری در دو جنس نر و ماده کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) در تالاب زیروار از نظر مقادیر فلزات سنگین وجود ندارد. آزمون همبستگی پیرسون بین فلزات سنگین (سرب، روی و کادمیوم) و وزن کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) در جدول ۴ نشان داده شده است. با توجه به یافته‌های این آزمون هیچ‌گونه همبستگی معنی‌دار بین فلزات مختلف مشاهده نشده هم‌چنین بین فلزات سنگین و وزن ماهی نیز هیچ‌گونه همبستگی وجود ندارد.

جدول ۲ مقادیر آماره‌های توصیفی فلزات سنگین در بافت عضله کپور معمولی در تالاب زیروار را گزارش می‌دهد. براساس یافته‌های این جدول کم‌ترین مقدار عناصر سرب، کادمیوم و روی به ترتیب ۰/۱۴، ۰/۳۴ و ۶۶/۹۵ میکروگرم برگرم، بیش‌ترین مقدار این عناصر به ترتیب ۰/۵۸، ۰/۴۹، ۴۹۹/۷۵ میکروگرم برگرم و نیز میانگین عناصر به ترتیب ۰/۰۸۸±۰/۰۳۳، ۰/۰۲۹±۰/۰۴۱ و ۱۲۷/۵۱۸۸±۲۰/۴۳ میکروگرم برگرم است. در ادامه یافته‌های آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن داده‌ها در جدول ۳ نشان داده شده است با توجه به یافته‌های این جدول سرب و کادمیوم از توزیع نرمال برخوردار بوده حال آن‌که داده‌های عنصر روی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند ($p > 0/01$). هم‌چنین مقایسه هر سه فلزات سنگین در دو جنس نر و ماده با استفاده از آزمون

جدول ۱: فهرست ماهیان بررسی شده (بومی و معرفی شده) تالاب زیروار (جلالی و همکاران، ۱۳۸۱)

Family : Cyprinidae	خانواده کپور ماهیان
<i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, ۱۷۸۵)	کپور معمولی
<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes in Cuvier Valenciennes, ۱۸۴۴)	کپور علفخوار
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, ۱۸۴۴)	کپورنقره ای
<i>Capoeta damascina</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, ۱۸۴۲)	سیا ماهی
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck and Schlegel, ۱۸۴۲)	آمور نما
<i>Chalcalburnus sp.</i>	شاه کولی
<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, ۱۷۵۸)	کاراس
Family: Poecilidae	خانواده کپور ماهیان دنداندار
<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, ۱۸۵۳)	گامبوزیا آفینیس
Family : Mastacembelidae	خانواده ماستاسمبلیده
<i>Mastacembelus mastacembelus</i> (Banks and Solander in Russel)	مارماهی خاردار



جدول ۱: آماره‌های توصیفی فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم وزن خشک در عضله) و وزن کپور معمولی تالاب زیروار


چولگی	کشدگی	اشتباه معیار	انحراف استاندارد	میانگین	بیش‌ترین	کم‌ترین	
۳/۸۹۹	۱۶/۳۷۰	۲۰/۴۴	۹۱/۴	۱۲۷/۵۲	۴۹۹/۷۵	۴۹۹/۷۵	روی
۰/۳۱۵	-۰/۵۵۶	۰/۰۳	۰/۱۳	۰/۳۳	۰/۵۸	۰/۱۴	سرب
۰/۸۰۴	۱/۰۰۷	-۰/۰۰۸	۰/۰۴	۰/۴	۰/۴۹	۰/۳۴	کادمیوم
-۰/۳۰	۱/۱۸	۱۰/۷۰	۴۷/۸۵	۳۸۸/۴۵	۴۸۲	۲۷۲	وزن

جدول ۳: نتایج آزمون نرمالیتی برای داده‌های فلزات سنگین


آماره	درجه آزادی	سطح معنی‌داری	
۰/۴۹	۲۰	۰/۰۰۰	روی
۰/۹۴	۲۰	۰/۲۹	سرب
۰/۹۶	۲۰	۰/۴۷	کادمیوم

جدول ۴: نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) بین فلزات سنگین و وزن

روی	سرب	کادمیوم	وزن	
۱	۰/۲۴	-۰/۱۲	-۰/۲۴	روی
	۱	۰/۱۵	-۰/۲۴	سرب
		۱	-۰/۲	کادمیوم
			۱	وزن



شکل ۲: مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در دو جنس نر و ماده کپور معمولی



شکل ۳: مقایسه غلظت روی در دو جنس نر و ماده کپور معمولی



بحث

استفاده می‌شود، برای اطمینان از سالم بودن آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. میزان اندازه‌گیری شده غلظت فلزات سنگین براساس جدول ۵ نشان می‌دهد که از استانداردهای جهانی نظیر WHO، NHMRC (مقادیر کادمیوم از این استاندارد بیش‌تر است)، MAFF، FDA و چند کشور مانند استرالیا، نیوزیلند، آلمان و سوئیس کم‌تر است (Tabari و همکاران، ۲۰۱۰؛ Pourang و همکاران، ۲۰۰۴؛ Maher، ۱۹۸۶). در جدول ۶ مقایسه با سایر پژوهش‌ها که در گونه کپور معمولی صورت گرفته انجام شده است. روی هم رفته این سه فلز به نسبت از مقادیر بالایی برخوردار هستند.

در این پژوهش مقادیر زیادی از روی مشاهده شد ولی با این وجود از هیچ‌یک از استانداردهای جهانی مانند WHO، FAO، FDA، NFA، UK (MAFF) و غیره بیش‌تر نبود. عنصر روی در مقایسه با اکثر پژوهش بیش‌تر است به‌جز در مورد مطالعه نصراله‌زاده ساروی (۱۳۹۲) که مقادیر روی را در عضله کپور معمولی ۱۸۵ میکروگرم بر گرم به‌دست آورد. روی در بدن مهره‌داران تحت شرایط طبیعی به‌میزان فراوان یافت می‌شود (Thompson و همکاران، ۲۰۱۲). افزایش غلظت روی در اکوسیستم‌های آبی می‌تواند بر اثر تخلیه پساب‌های صنعتی و رسوب روی از طریق اتمسفر، شستشوی فاضلاب‌های محلی و مواد زائد فعالیت‌های معدنی، آفت‌کش‌ها و فرآیندهای گالوانیزاسیون باشد. بنابراین در آب‌های با سختی کم، سمیت فلزات سنگین افزایش پیدا می‌کند (Kim و Yim، ۲۰۰۶). تیپ آب دریاچه بی‌کربنات کلسیک و از نظر سختی جزء آب‌های سخت است (ابراهیم‌پور و محمدزاده، ۱۳۹۰).

ماهی به‌طور کلی یکی از منابع اصلی پروتئین برای انسان و نمایه زیستی سودمندی برای تعیین آلودگی فلزات سنگین در اکوسیستم‌های آبی است. ماهی برای این که شاخص خوبی باشد، افزون بر این که دیرزی و بومی باشد، بایستی پایش پیوسته آن حضور آلاینده‌ها را نشان داده و نیز نمونه‌گیری آن آسان باشد. ماهی فلزات را از طریق زنجیره غذایی و آب در بدن خود انباشته می‌کند. فلزات از سه راه وارد بدن ماهی می‌شوند (از راه دستگاه گوارش، آبشش و سطح بدن) غلظت فلزات سنگین در ماهی به عوامل گوناگون هم‌چون نیازهای اکولوژیکی، اندازه و سن افراد، چرخه زندگی و تاریخ زندگی، عادات غذایی، فصل صید و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب بستگی دارد (Basyigit و Tekin-Ozan، ۲۰۱۳). در زمینه انباشت فلزات سنگین در بافت‌های گوناگون ماهی پژوهش‌های بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد یک فلز ممکن است انباشت بیش‌تری در یک اندام ویژه داشته باشد. به‌عنوان نمونه Chi و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه روی چند گونه ماهی دریافتند که مس و کادمیوم در کبد، سرب در تمام اندام‌های ماهی، کروم به‌طور عمده در پوست و غدد تناسلی و روی در گنادها بیش‌ترین انباشت را دارند. بیش‌تر تحقیق‌ها نشان داده‌اند که میزان فلزات سنگین در کبد کپور معمولی بیش‌تر از عضله است (Sobhan Ardakani و Jafari، ۲۰۱۴؛ Yancheva و همکاران، ۲۰۱۴؛ بندانی و همکاران، ۱۳۸۹؛ Chi و همکاران، ۲۰۰۷؛ Erbilir و Erdoğan، ۲۰۰۷) با این حال نظر به این که بافت عضله ماهی نقش مهمی در تغذیه انسان دارد و نیز در پایش معمول آلودگی فلزی از بافت عضله

جدول ۵: مقایسه غلظت فلزات در بافت خوراکی (میکروگرم بر گرم وزن تر) بر اساس استانداردهای گوناگون

استانداردها	کادمیوم	سرب	روی	مرجع
WHO	۰/۲	۰/۳	۱۰۰۰	Tabari و همکاران، ۲۰۱۰
FAO	۰/۳	۲	۵۰	FAO، ۱۹۸۳
NHMRC	۰/۰۵	۱/۵	۱۵۰	Maher، ۱۹۸۶
FDA	۲	۵	۳۵	Pourang و همکاران، ۲۰۰۴
NFA	۰/۲	-	-	Darmono، ۱۹۹۰
U.K (MAFF)	۰/۲	۲	۵۰	Maher، ۱۹۸۶
New Zealand	۱	۲	۴۰	Maher، ۱۹۸۳
Australia	۵/۵-۰/۲	-	۱۰۰۰-۴۰	Bashkin و Radojevi، ۲۰۰۶
Germany	۰/۵	۰/۵	-	Merian، ۱۹۹۱
Swiss	۱	۰/۱	-	Nauen، ۱۹۸۳
تالاب زریوار	۰/۰۸	۰/۰۶	۲۵/۴۵	پژوهش حاضر



جدول ۶: مقایسه فلزات سنگین (میکروگرم / گرم وزن خشک) در عضله کپور معمولی با پژوهش‌های دیگر

مرجع	سرب	کادمیوم	روی	گونه
Mendil و همکاران، ۲۰۰۴	۱/۳	۰/۳	۳۲/۱	<i>Cyprinus carpio</i>
Chi و همکاران، ۲۰۰۷	۰/۱۷	۰/۰۲	۲۵	<i>Cyprinus carpio</i>
Chi و همکاران، ۲۰۰۷	۰/۲۹	۰/۰۱	۱۳۰	<i>Carasius auratus</i>
Panahandeh و همکاران، ۲۰۱۴	۱/۵۶	۰/۱۶	۱۸/۳	<i>Cyprinus carpio</i>
پاکزاد توچایی، ۱۳۹۲	۰/۲۹	-	۷۲/۲	<i>Hipophthalmichthys molitrix</i>
بابائی و خداپرست، ۱۳۹۱	۰/۹۷	۰/۲۳	۲۳/۴۵	<i>Cyprinus carpio</i>
رحیمی و رئیسی، ۱۳۸۷	۰/۱۲	۰/۰۸	-	<i>Cyprinus carpio</i>
نصراله‌زاده ساروی، ۱۳۹۲	*	*	۱۸۵	<i>Cyprinus carpio</i> منطقه جنوبی دریای خزر
بندانی و همکاران، ۱۳۸۵	۰/۰۷	۰/۰۳	۲/۲۷	<i>Cyprinus carpio</i> سواحل گلستان
پژوهش حاضر	۰/۳۳	۰/۴	۱۲۷/۵۲	<i>Cyprinus carpio</i> تالاب زریوار

• غیرقابل تشخیص

مقادیر بالای این فلزات بی‌شک مرتبط با کاربری‌های اطراف تالاب است. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که در اثر فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی در اطراف دریاچه به‌ویژه در بخش‌های شمالی، شرقی و غربی تالاب (رواناب سطحی) و استفاده از کودهای گوناگون، فضولات دامی و سموم آفت‌کش، مقدار زیادی آلاینده وارد دریاچه می‌شود. افزون بر این دیگر عوامل آلاینده هم‌چون فاضلاب شهری و روستایی تصفیه نشده و زباله‌های جامد برجسته‌ترین عامل آلودگی تالاب به‌شمار می‌آیند (ابراهیم‌پور و محمدزاده، ۱۳۹۲؛ Ghaderi و Ghafouri، ۲۰۰۶). کودهای فسفره شامل مقادیر چشمگیری کادمیوم و در رتبه بعدی سایر فلزات مانند سرب هستند که وارد خاک شده و به سادگی توسط شویش و رواناب‌های کشاورزی می‌تواند وارد تالاب شود که به‌دلیل سمیت بالا و حلالیت زیاد در آب، یک آلاینده خطرناک است (Duman و Tug، ۲۰۱۰). هم‌چنین وجود فلزات سنگین در کودهای نیتروژنی از جمله اوره، نیترات آمونیوم و نیترات کلسیم گزارش شده است که محدوده بین ۰ تا ۳۰۰۰ میکروگرم بر گرم دارند (Sherene، ۲۰۱۰). Sharifinia و همکاران (۲۰۱۴) در ارزیابی کیفیت آب دریاچه زریوار، در میان پارمترهای مختلف (نیترات، نیتريت، ارتوفسفات، آهن و شوری) بیش‌ترین مقدار را برای نیترات به‌دست آوردند که استفاده از کودهای ازته در زمین‌های کشاورزی و خروجی فاضلاب‌های خانگی را سبب افزایش محتوای نیترات تالاب دانسته‌اند. ورود پساب حاوی کود و مواد زائد دامی در فصل بارندگی از طرف روستاهای ضلع غربی نیز ممکن است سبب آلودگی تالاب به فلزات شود. کودهای حیوانی نیز کودهای آلی هستند که سبب آلودگی خاک به فلزات سنگین می‌شوند (Lupascun و

فاکتورهای شیمیایی آب شامل غلظت اکسیژن، pH، سختی و دمای آب سمیت روی را تغییر می‌دهد. دمای بالا نیز سمیت فلز روی را افزایش می‌دهد. درحالی‌که افزایش کلیاتیت، سختی و ترکیبات آلی آب می‌توانند سبب کاهش کشندگی حاد ناشی از مسمومیت روی شود (Gul و همکاران، ۲۰۰۹). در میان فلزات سنگین از نظر کمی، بیش از همه سرب در محیط‌های آبی پراکنده است. سرب از عناصری است که ضریب جذب بالایی از طریق تنفس برخوردار است (عسکری ساری، ۱۳۸۹).

میانگین غلظت سرب در این مطالعه (۰/۳۳ میکروگرم بر گرم) بود که کم‌تر از نتایج Mendil و همکاران (۲۰۰۴)، Panahandeh و همکاران (۲۰۱۴)، بابائی و خداپرست (۱۳۹۱) است و از سایر پژوهش‌ها مانند بندانی و همکاران (۱۳۸۵) رحیمی و رئیسی (۱۳۸۷) و سایر پژوهش‌ها بالاتر است و از استانداردهایی چون NHMRC برابر با ۱/۵ و UK (MAFF) برابر با ۲ میکروگرم بر گرم کم‌تر است. میزان قابل تحمل سرب برای آبیان ۳۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌باشد که بیانگر عدم آلودگی شدید این ماهی به عنصر سرب است، که کم‌ترین میزان جذب و انباشت این عنصر در عضله ماهی کپور معمولی تالاب زریوار ۰/۱۴ می‌باشد که این امر می‌تواند گویای اطمینان از سلامت نسبی این ماهی باشد. میانگین غلظت کادمیوم در این مطالعه ۰/۳۹۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌دست آمده که کادمیوم در ماهی کپور معمولی در تالاب زریوار هم مقادیر به نسبت بالایی دارد و از همه پژوهش‌های ذکر شده در جدول ۶ بیش‌تر است. در مقایسه با استانداردهای WHO، FAO، FDA، NFA، UK (MAFF) و از همه کشورهای ذکر شده در جدول پایین‌تر است اما از استاندارد NHMRC بیش‌تر می‌باشد.



گونه خطری انسان را تهدید نمی‌کند لیکن با افزایش روز افزون استفاده از کودهای شیمیایی که مقادیر بالای کادمیوم در عضله این گونه شاید مرتبط با استفاده از این نهاده باشد، ممکن است این مقادیر در آینده نزدیک از استانداردها تخطی کند. همچنین وجود منابع آلاینده در این منطقه، ورود فاضلاب‌های شهری، کشاورزی، تردد بیش‌تر فایق‌های تفریحی می‌تواند موجب افزایش سرب گردد، از طرفی وضعیت زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیک و وجود فعالیت‌های کشاورزی در پی آن فرسایش و انحلال بیش‌تر عنصر روی را سبب می‌شود.

در ادامه پیشنهاد می‌گردد سایر فلزات سنگین و سمی در گونه (cyprinus carpio) بررسی گردد. همچنین میزان فلزات سنگین و دیگر آلاینده‌های آلی در گونه‌های دیگر ماهی موجود در تالاب زریوار و نیز در بخش‌های گوناگون دیگر مانند آب و گیاه بررسی شوند. همچنین سنجش میزان فلزات سنگین در رسوبات کف تالاب انجام شود و اندام‌های دیگر ماهی (کبد، کلیه، آبشش و غیره) مورد آزمایش واقع گردند.

تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه ملایر انجام شده است. نویسندگان این مقاله، مراتب سپاس خود را از دانشگاه ملایر که امکانات اجرایی این تحقیق را فراهم آورد ابراز می‌دارند.

منابع

1. ابراهیم‌پور، ص. و محمدزاده، ح.، ۱۳۹۲. ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب دریاچه زریوار با استفاده شاخص‌های از کیفی CWQI, OWQI NSFQI. پژوهش‌های محیط‌زیست. سال ۴، شماره ۷، صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۶.
2. ابراهیم‌پور، ص. و محمدزاده، ح.، ۱۳۹۰. بررسی هیدرو ژئوشیمی و عوامل کنترل‌کننده شیمی آب دریاچه زریوار (زریبار). هفتمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. دانشگاه صنعتی شاهرود.
3. بابائی، ه. و خداپرست، س. ح.، ۱۳۹۱. بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات سطحی و اندام‌های مختلف ماهی کپور تالاب بین‌المللی انزلی. کنگره عناصر کمیاب ایران. دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
4. بندانی، غ.؛ خوشباور رستمی، ح.؛ یلقی، س.؛ شکرزاده، م. و نظری، ح.، ۱۳۸۹. سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور

همکاران، ۲۰۰۷). در این‌جا مقادیر بالای روی ممکن است به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی و حیوانی در زمین‌های کشاورزی و نتیجه شویش آن به تالاب باشد که به شکل آشکار مقادیر زیاد روی در بافت عضله ماهی کپور معمولی تالاب مشاهده می‌شود. از طرفی یافته‌های حاصل از بررسی‌های انجام شده توسط رفیعی و همکاران (۱۳۹۲) در این منطقه نشان می‌دهد که رسوبات دریاچه زریوار از نظر دانه‌سنجی، بیش‌تر در زمره رسوبات ریزدانه بوده و بافت آن اغلب در محدوده گل ماسه‌ای قرار می‌گیرد و همچنین رسوبات منطقه مورد مطالعه دارای درصد بالایی از ماده آلی است و افزایش مقدار ماده آلی می‌تواند بر مقدار تمرکز عناصر سنگین بیفزاید.

بنابراین با نگرش به این‌که کپور معمولی یک ماهی همه‌چیزخوار بوده و از بی‌مهرگان کفزی، مواد خورده ریز بستر و مواد گیاهی تغذیه می‌کند و روی هم رفته غذاهای کف را بیش‌تر می‌پسندد به آسانی در معرض این آلاینده‌ها قرار گرفته است و مقادیر کم و بیش بالا در آن خود گویای این مسئله است (Ayas و همکاران، ۲۰۰۷). یافته‌های Yousafzai و همکاران (۲۰۱۰) نشان می‌دهد که در زیستگاه‌های طبیعی ماهی‌های همه‌چیزخوار فلزات سنگین را بیش‌تر از ماهی‌های گوشت‌خوار انباشت می‌کنند. در پژوهش رفیعی و همکاران (۱۳۹۲) در رسوبات بستر دریاچه زریوار آلودگی فلزی مشاهده نگردیده است اما در این پژوهش مقادیر بیش‌تری در عضله ماهی مشاهده شد که نشان می‌دهد ماهی می‌تواند مقادیر چند برابر از یک آلاینده را در بدن خود ذخیره کند و می‌تواند نمایه زیستی خوبی برای ارزیابی سلامت تالاب و گونه‌های آن باشد. دستاوردهای این تحقیق نشان داد که فلزات موجود در تالاب توسط ماهی از طریق غذا، آب و رسوب جذب شده‌اند و به نسبت مقادیر بالایی از فلزات در بدن ماهی انباشت پیدا کرده‌اند. به‌طور کلی جذب فلزات سنگین از آب، غذا و رسوب (برای موجودات کفزی) رخ می‌دهد با این حال، جذب فلز از آب بسیار بیش‌تر از جذب از رسوب است. البته باید تاکید کرد، که جذب فلز از آب آلوده و مواد غذایی ممکن است در رابطه با نیازهای بوم‌شناسی، سوخت و ساز بدن و درجه آلودگی آب، مواد غذایی و رسوب و همچنین عوامل دیگر مانند شوری، درجه حرارت و همکنش عوامل متفاوت است (Yousuf و همکاران، ۲۰۱۳).

روی هم رفته یافته‌ها نشان داد که غلظت کادمیوم در عضله این گونه از استاندارد NHMRC بیش‌تر است. درحالی‌که غلظت سرب و روی در بافت عضله این گونه از هیچ‌کدام یک از استانداردها بالاتر نبود. بنابراین در حال حاضر از نظر مصرف این



- Turkey. Journal of Environmental Biology. Vol. 28, No. 3, pp: 545-549.
16. **Basyigit, B. and Tekin-Ozan, S., 2013.** Concentrations of Some Heavy Metals in Water, Sediment, and Tissues of Pikeperch. (*Sander lucioperca*) from Karataş Lake Related to Physico-Chemical parameters, fish size, and seasons. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 22, No. 3, pp: 633-644.
 17. **Chi, Q.; Zhu, G. and Alan, L., 2007.** Bioaccumulation of heavy metals in fishes from Taihu Lake, China. Environ Sci. Vol. 19, No. 12, pp: 1500-1504.
 18. **Darmono, D. and Denton, G.R.W., 1990.** Heavy metal concentration in the banana prawn (*Penaeus merguensis*) and leader prawn (*P. monodon*) in the Townsville region of Australia. Bull. Environ. Contam. Toxicol. Vol. 44, pp: 479-486.
 19. **Eboh, L.; Mepba, H.D. and Ekpo, M.B., 2006.** Heavy metal contaminants and processing effects on the composition, storage stability and fatty acid profiles of five common commercially available fish species in Oron Local Government, Nigeria. Journal of Food Chemistry. Vol. 97, No. 3, pp: 490-497.
 20. **Erdogru, Ö. and Erbilir, F., 2007.** Heavy Metal and Trace Elements in Various Fish Samples from Sir Dam Lake, Kahramanmaraş, Turkey. Environ Monit Assess. Vol. 130, pp: 373-379.
 21. **FAO, 1983.** Compilation of legal limits for hazardous substance in fish and fishery products (Food and Agricultural Organization). FAO fishery circular. Vol. 464, pp: 5-100.
 22. **Ghaderi, N. and Ghafouri, A.M., 2006.** Comparative assessment of natural (forest and range) versus manmade (agriculture and urbane) environment in lake Zarivar, Irania. J For Range Protect Res. Vol. 4, pp: 19-27.
 23. **Gul, A.; Yilmaz, M. and Işlak, Z., 2009.** Acute Toxicity of Zinc Sulphate ($ZnSO_4 \cdot H_2O$) to Guppies (*Poecilia reticulata* P., 1859). G.U. Journal of Science. Vol. 22, No. 2, pp: 59-65.
 24. **Harkabusová, V.; Čelechovská, O.; Lavičková, A. and Svobodová, Z., 2012.** Monitoring of risk metals in chub (*Leuciscus cephalus* L.) from the Svitava and Svratka rivers in the urban area of Brno, Czech Republic. Acta Vet. Brno. Vol. 81, pp: 069-073.
 25. **Hosseini Alhashemi, A.; Karbassi, A.; Hassanzadeh Kiabi, B.; Monavari, S.M. and Sekhvatjou, M.S., 2012.** Bioaccumulation of trace elements in different tissues of three commonly available fish species regarding their gender, gonadosomatic index, and condition factor in a wetland ecosystem. Environ Monit Assess. Vol. 184, pp: 1865-1878.
 26. **Karpagavalli, M.S.; Malini, P. and Ramachandran, A., 2012.** Analysis of heavy metals in dying wetland Pallikaranai, Tamil Nadu, India. J. Environ. Biol. Vol. 33, pp: 757-761.
 27. **Lupascun, A.; Chirila, E. and Munteanu, M., 2009.** Heavy metal contaminants in organic fertilizers. Ovidius University Annals of Chemistry. Vol. 20, No. 2, pp: 232-234.
 28. **Maceda-Veiga, A.; Monroy, M. and De Sostoa, A., 2012.** Metal bioaccumulation in the Mediterranean barbel (*Barbus meridionalis*) in a Mediterranean River receiving effluents from urban and industrial wastewater treatment plants. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 76, No. 1, pp: 93-101.
- سواحل استان گلستان. مجله علمی شیلات ایران. سال ۱۹، شماره ۴، صفحات ۱ تا ۱۰.
 ۵. **جلالی، ب.؛ بزرگر، م. و سهرابی‌حقدوست، ا.، ۱۳۸۱.** بررسی مقدماتی انگل‌های برخی ماهیان دریاچه زریوار. علوم دریایی ایران. شماره ۲، صفحات ۲۷ تا ۴۰.
 ۶. **رحیمی، ا. و رئیس، م.، ۱۳۸۷.** تعیین میزان سرب و کادمیم در گوشت ماهیان صید شده از تالاب چغاخور استان چهار محال و بختیاری. مجله دامپزشکی ایران. دوره ۴، شماره ۴، صفحات ۷۹ تا ۸۳.
 ۷. **رشیدی، آ.؛ مخدوم، م.؛ فقهی، ج. و شریفی، م.، ۱۳۸۹.** ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). پژوهش‌های محیط‌زیست. سال ۱، شماره ۲، صفحات ۱۹ تا ۳۰.
 ۸. **رفیعی، ب.؛ حسین‌پناهی، ف. و شکیب‌آزاد، ع.، ۱۳۹۲.** بررسی آلودگی فلزات سنگین (Ni و Zn، Pb، Cr، Cu) در رسوبات بستر دریاچه زریوار. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تهران.
 ۹. **عسکری‌ساری، ا.، ۱۳۸۹.** بررسی عناصر سنگین (سرب، جیوه و کادمیم) در ماهیان بومی آب شیرین شیریت (*Barbus grypus*) و بیاح (*Liza abu*) صید رودخانه‌های کارون و کرخه در فصل زمستان. مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا. سال ۱، شماره ۴، صفحات ۹۵ تا ۱۰۷.
 ۱۰. **نصراله‌زاده ساروی، ح.؛ پورغلام، ر.؛ پورنگ، ن.؛ رضایی، م.؛ مخلوق، آ. و یونس‌پور، ح.، ۱۳۹۲.** مطالعه تجمع برخی از فلزات سنگین در بافت خوراکی ماهی کپور (*Cyprinus Carpio*) و برآورد میزان سیبیل خطر در حوزه ایرانی دریای خزر (سال ۱۳۸۹). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره ۲۳، شماره ۱۰۳، صفحات ۳۳-۴۴.
 11. **Agarwal, N., 2008.** Wetlands: Future on stake, Proceedings of Taal: The 12th World Lake Conference. pp: 1312-1314.
 12. **Al-Weher, S.M., 2008.** Levels of Heavy Metal Cd, Cu and Zn in three Fish Species Collected from the Northern Jordan Valley, Jordan. Jordan Journal of Biological Sciences. Vol. 1, No. 1, pp: 41-46.
 13. **Ashraf, W.; Seddigi, Z.; Abulkiabash, A. and Khalid, M., 2006.** Levels of selected metals in canned fish consumed in Kingdom of Saudia Arabia. Environ Monit Assess. Vol. 117, pp: 271-279.
 14. **Ayandiran, T.A.; Fawole, O.O.; Adewoye, S.O. and Ogundiran, M.A., 2009.** Bioconcentration of metals in the body muscle and gut of *Clarias gariepinus* exposed to sublethal concentrations of soap and detergent effluent. Journal of Cell and Animal Biology. Vol. 3, No. 8, pp: 113-118.
 15. **Ayas, Z.; Ekmekci, G.; Vahdet Yerli, S.T. and Ozmen, M., 2007.** Heavy metal accumulation in water, sediments and fishes of Nallihan Bird Paradise,



- Wetland, Western Iran Journal of Chemical Health Risks. Vol. 4, No. 2, pp: 47-54.
45. **Tabari, S.; Saeedi Saravi, S.S.; Bandani, G.H.; Dehghan, A. and Shokrzade, M., 2010.** Heavy metals (Zn, Pb, Cd and Cr) in fish, Water and sediment sampled from Southern Caspian Sea, Iran. Toxicol Ind Health. Vol. 26, No. 10, pp: 649-656.
 46. **Thompson, E.D.; Gregory, D.M.; Glover, C.N.; Capo, T.; Walsh, P.J. and Hogstrand, C., 2012.** Zinc Hyperaccumulation in Squirrelfish (*Holocentrus adscensionis*) and Its Role in Embryo Viability. Plosone. Vol. 7, No. 10, pp: 46127.
 47. **Tug, G.N. and Duman, F., 2010.** Heavy metal accumulation in soils around a salt lake in turkey. Pak. J. Bot. Vol. 42, No. 4, pp: 2327-2333.
 48. **Wang, X.F.; Chen, H.G.; Zhang, Z.; Cai, W.G. and Jia, X.P., 2013.** Effects of Acute Waterborne Cadmium Exposure on Activities of Antioxidant Enzyme and Acetylcholinesterase in the Fish Crimson Red Snapper (*Lutjanus Erythropterus*). Nature Environment and Pollution Technology An International Quarterly Scientific Journal. Vol. 12, No. 2, pp: 349-353.
 49. **Yancheva, V.; Stoyanova, S.; Velcheva, I.; Petrova, S. and Georgieva, E., 2014.** Metal bioaccumulation in common carp and rudd from the Topolnitsa reservoir, Bulgaria. Arh Hig Rada Toksikol. Vol. 65, pp: 57-66
 50. **Yap, C.K.; Ismail, A.; Tan, S.G. and Omar, H., 2002.** Concentrations of Cu and Pb in the offshore and intertidal sediments of the west coast of Peninsular Malaysia. Environ. Int. Vol. 28, pp: 467-479.
 51. **Yim, J.H. and Kim, S.D., 2006.** Effects of hardness on acute toxicity of metal mixtures using *Daphnia magna*. Hazard. Mater. Vol. 138, pp: 16-21.
 52. **Yousafzai, A.M.; Chivers, D.P.; Khan, A.R.; Ahmad, I. and Siraj, M., 2010.** Comparison of Heavy Metals Burden in Two Freshwater Fishes Wallago attu and Labeo dyocheilus With Regard to Their Feeding Habits in Natural Ecosystem. Pakistan J. Zool. Vol. 42, No. 5, pp: 537-544.
 53. **Yousuf, R.; Hussain Mir, S.M.; Darzi, M. and Saleem Mir, M., 2013.** Metals and Histopathological Alterations in the Kidneys of *Schizothorax niger*, Heckel from the Dal Lake of Kashmir Valley. J Interdiscipl Histopathol. Vol. 1, No. 2, pp: 74-80.
 29. **Maher, W.A., 1986.** Trace metal concentrations in marine organisms from St. Vincent Gulf, South Australia. Water Air Soil Pollut. Vol. 29, No. 1, pp: 77-84.
 30. **Mendil, D.; Uluozlu, O.D.; Hasdemir, E.; Tuzen, M.; Sari, H. and Suicmez, M., 2004.** Determination of trace metal levels in seven fish species in lakes in Tokat, Turkey. Food Chem. Vol. 90, No. 1-2, pp: 175-179.
 31. **Merian, E., 1991.** Metals and their Compounds in the Environment Occurrence, Analysis and Biological Relevance, Weinheim. 704 p.
 32. **Nauen, C.E., 1983.** Compilation of Legal Limits for Hazardous Substances in Fish and Fishery Products. FAO Fisheries Circular No. 764, Rome, Italy. 102 p.
 33. **Nwani, C.D.; Nwachi, D.A.; Okogwu, O.J.; Ude, E.F. and Odoh, G.E., 2010.** Heavy metals in fish species from lotic freshwater ecosystem at Afikpo, Nigeria. Journal of Environmental Biology. Vol. 31, No. 5, pp: 595-601.
 34. **Olaifa, F.G.; Olaifa, A.K. and Onwude, T.E., 2004a.** Lethal and sublethal effects of copper to the African Cat fish (*Clarias gariepinus*). Afr. J. Biomed. Res. Vol. 7, pp: 65-70.
 35. **Olaifa, F.E.; Olaifa, A.K.; Adelaja, A.A. and Owolabi, A.G., 2004b.** Heavy metal contamination of *Clarias garpinus* from a lake and Fish farm in Ibadan, Nigeria. Afric. J. of Biomed. Res. Vol. 7, pp: 145-148.
 36. **Palaniappan, R.M. and Karthikeyan, S., 2009.** Bioaccumulation and depuration of chromium in the selected organs and whole body tissues of freshwater fish *Cirrhinus mrigala* individually and in binary solutions with nickel. J Environ Sci. Vol. 21, pp: 229-236.
 37. **Panahandeh, M.; Mansouri, N.; Khorasani, N.; Karbassi, A. and Riaz, B., 2014.** A study of heavy metals concentration in water, sediments and *Cyprinus carpio*, *Abramis brama*, *Carassius carassius* species from Anzali Wetland. International Journal of Biosciences. Vol. 4, No. 11, pp: 51-59.
 38. **Pourang, N.; Dennis, J.H. and Ghoorchian, H., 2004.** Tissue distributions on the roles of metallothionin, Ecotoxicology. Vol. 13, pp: 519-533.
 39. **Prasad, S.N.; Ramachandra, T.V.; Ahaly, N.; Sengupta, T.T.; Vijayan, A.K. and Lalitha Vijayan, V.S., 2002.** Conservation of wetlands of India (A Review). Tropical. Ecol. Vol. 43, pp: 173-186.
 40. **Radojevi, M. and Bashkin, V.N., 2006.** Practical Environmental Analysis, 2th ed. Cambridge: the Royal Society of Chemistry.
 41. **Sani, U., 2011.** Determination of some heavy metals concentration in the tissues of Tilapia and Catfishes. Biokemistri. Vol. 23, No. 2, pp: 73-80.
 42. **Sharifinia, M.; Ramezani, Z.; Imanpour, J.; Mahmoudifard, A. and Rahmani, T., 2013.** Water quality assessment of the Zarivar Lake using physico-chemical parameters and NSF- WQI indicator, Kurdistan Province-Iran. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Vol. 1, No. 3, pp: 302-312.
 43. **Sherene, T., 2010.** Mobility and transport of heavy metals in polluted soil environment. Biological Forum. An International Journal. Vol. 2, No. 2, pp: 112-121.
 44. **Sobhan Ardakani, S. and Jafari, S., 2014.** Assessment of Heavy Metals (Cu, Pb and Zn) in Different Tissues of Common Carp (*Cyprinus carpio*) Caught from Shirinsu

