

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پایکا (*Ochotona rufescens*) با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

- **محمد حسنی***: گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹
- **حسین وارسته مرادی**: گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹
- **حمید بخشی**: گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹

تاریخ دریافت: فروردین ۱۳۹۳ تاریخ پذیرش: تیر ۱۳۹۳

چکیده

ویژگی بوم‌شناختی گونه‌ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آن‌ها، یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونه‌های حیات وحش محسوب می‌گردد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه پایکا (*Ochotona rufescens*) در پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) و نرم افزار بایومپر استفاده شد. لایه‌های اطلاعاتی به کار برده شده به عنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل ارتفاع، شیب، جهت، شاخص پوشش گیاهی (NDVI) ۱، فاصله از چشمه‌ها و رودخانه بود. نتایج در سطح معنی داری ۹۵ درصد نشان داد که زیستگاه مطلوب این گونه به طور میانگین در ارتفاع ۱۳۲۵ متر از سطح دریا و در شیب‌های ۲۱ درجه، جهت جنوبی، فواصل ۲۲۹۱ و ۳۰۵۴ متری از آبراهه و چشمه‌ها قرار دارد. نتایج حاصل از مدل سازی مطلوبیت زیستگاه نشان داد که زیستگاه مطلوب پایکا در پارک ملی گلستان عمدتاً در مناطق صخره‌ای و کوهستانی با پوشش استپی است. پایکاها دارای آشیان بوم‌شناختی میانه‌ای هستند و به زیستگاه‌های حاشیه‌ای تمایل بیش تری دارند.

کلمات کلیدی: مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، پایکا، تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی، پارک ملی گلستان

۱- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)



مقدمه

قوچ و ميش اصفهاني در پارک ملي کلاه قاضى را با روش ENFA انجام دادند. Bruggeman (۲۰۱۰) به بررسى فاکتورهاي موثر بر جمعيت‌هاي پايكا آمريکايى (*Ochotona princeps*) در شمال پارک ملي Cascades پرداخت. Haleem و همکاران (۲۰۱۲) به مطالعه و بررسى فراوانى و توزيع پايكا (*Ochotona roylei*) در حيات وحش Kedarnath در ارتفاعات مختلف Uttarakhand هيماليا از هند پرداختند. Richardson (۲۰۱۲) به بررسى رابطه بين ارتفاع، درجه حرارت و روش‌هاي علف‌چرى در پايکاي آمريکايى (*Ochotona princeps*) در شمال پارک ملي Cascades در واشنگتن پرداخت. هرچند مطالعات بسيارى در مورد ارزشيابى زيستگاه گونه‌هاي مختلف حيات وحش با روش‌هاي متفاوت در ايران صورت گرفته است، ولى در مورد زيستگاه پايكا افغانى (Afghan Pika) مطالعات محدودى در ايران انجام شده که از آن جمله مى‌توان به ارزشيابى زيستگاه پايکاي افغانى توسط خاکی صحنه و همکاران (۱۳۹۰) در منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان انجام شده اشاره کرد. هدف از اين مطالعه مشخص نمودن عوامل موثر بر مطلوبيت زيستگاه پايکا در پارک ملي گلستان به‌عنوان الگويى از زيستگاه‌هاي کوهستانی ايران، تعيين مطلوبيت زيستگاه گونه در اين منطقه و در نهايت بررسى امکان به‌کارگيرى روش ENFA در امر مديريت و حفاظت گونه‌هاي مختلف حيات وحش مى‌باشد.

مواد و روش‌ها

منطقه مطالعاتی: پارک ملي گلستان منطقه‌اي کوهستانی است که در منتهی‌الیه شرق جنگل‌هاي شمال کشور واقع شده است. اين پارک از نظر موقعيت جغرافيايى در حد فاصل $34^{\circ} 16' 37''$ تا $31^{\circ} 00' 37''$ عرض شمالی و $55^{\circ} 43' 00''$ تا $55^{\circ} 17' 56''$ طول شرقی بين شهرستان‌هاي گنبد قابوس و بجنورد قرار گرفته است. پارک ملي گلستان در ۵۵ كيلومتری شرق گنبد قابوس و ۱۱۵ كيلومتری غرب بجنورد و در مسیر بزرگراه آسیايى تهران- مشهد واقع شده است که اين بزرگراه به طول ۳۵ كيلومتر آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسيم مى‌کند. اين پارک در حوزه قضايی سه استان خراسان شمالی، سمنان و گلستان قرار دارد، اما از نظر تشکيلات و مسئوليت حفاظتی تحت نظر اداره کل حفاظت محيط زيست استان گلستان قرار دارد (مجنونيان و همکاران، ۱۳۷۸) و منطقه‌اي کوهستانی با دامنه ارتفاع ۴۵۰ تا ۲۴۱۱ متر از سطح دريا و با مساحتی برابر با ۹۱۸۹۵ هکتار است (درويش‌صفت، ۱۳۸۵).

تعيين مطلوبيت زيستگاه يکي از ارکان مديريت و حفاظت گونه‌هاي حيات وحش محسوب مى‌گردد. مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای مطالعه زيستگاه‌ها در مقياس وسيع -مثلاً در مقياس يک استان- اجرائى بسيارى از مطالعات را دشوار مى‌سازد. لذا روش‌هاي مدل‌سازى زيستگاه که از سال ۱۹۷۰ تا کنون به سرعت در مديريت حيات وحش مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ابزاري مناسب برای غلبه بر اين مشکل معرفى شده‌اند (Anderson و همکاران، ۲۰۰۰). مطالعه انتخاب زيستگاه از طريق مدل‌سازى اطلاعات مفيدى را در زمينه رابطه بين زيستگاه و گونه‌ها فراهم مى‌کند (Olivier و Wotherspoon، ۲۰۰۶). با روش‌هاي مدل‌سازى زيستگاه به يک برآورد در مقياس وسيع از مطلوبيت زيستگاه گونه‌هاي حيات وحش بدون نياز به جمع‌آورى اطلاعات از جزئيات ويژگي‌هاي فيزيولوژيک و رفتارى گونه مى‌توان دست يافت (Morrison و همکاران، ۱۹۹۲). مشخص کردن محدوده پراکنش گونه‌ها، شناخت پارامترهاي محيطی که توسط گونه در يک منطقه انتخاب مى‌شود و پراکنش زيستگاه‌هاي مناسب از مهم‌ترين فعاليت‌ها در زيست‌شناسی حفاظت محسوب مى‌شوند (ملکی‌نجف‌آبادی و همکاران، ۱۳۸۹). با مدل‌سازى زيستگاه گونه‌ها براساس سيستم اطلاعات جغرافيايى از طريق رکوردهاي ثبت شده گونه، مى‌توان توزيع گونه را تخمين زد و برای ارزشيابى حفاظت مورد استفاده قرار داد (Anderson و Meyer، ۲۰۰۴). اغلب مدل‌هاي پيش‌بینی توزيع جغرافيايى گونه‌ها، بر مفهوم آشيان بوم‌شناختی استوار هستند که به بررسى ارتباط حضور گونه با متغيرهاي محيطی مى‌پردازند (فراشى و همکاران، ۱۳۸۸). اخيراً يک روش مناسب برای غلبه بر اين مشکل به‌نام تحليل عاملی آشيان بوم‌شناختی (ENFA)^۱ دسته روش‌هاي نوين مدل‌سازى با به کارگيرى داده‌هاي فقط حضور گونه است و به دليل صرفه جويی در زمان و کاهش هزينه مطالعه، به گستردگي مورد استفاده محققان قرار مى‌گيرد (Master و همکاران، ۲۰۰۷؛ Hirzel و Guisan، ۲۰۰۲). اين روش تا حدود زيادى به تحليل به مؤلفه‌هاي اصلى (PCA)^۲ شبیه است و با تبديل متغيرهاي زيستگاهی به عوامل (Factors) به بررسى رابطه حضور گونه با متغيرهاي مستقل زيست محيطی مى‌پردازد. اميدى و همکاران (۱۳۸۸) و فلاح‌باقری و همکاران (۱۳۸۸) به ترتيب مطلوبيت زيستگاه پلنگ و ارزشيابى زيستگاه

^۱ Ecological Niche Factor Analysis (ENFA)

^۲ Principal Component Analysis (PCA)



مدل می‌بایست متغیرهای متناسب با آن را جمع‌آوری کرد. سه دسته از متغیرهای اکولوژیکی که به‌عنوان مشخصه‌های پیش‌گویی کننده حضور گونه معرفی شده‌اند عبارتند از (Guisan و Zimmermann, ۲۰۰۰):

الف- متغیرهای مربوط به منابع مورد نیاز گونه^۲: نشان‌دهنده ماده و انرژی مصرف شده توسط گیاهان و جانوران هستند. از قبیل: مواد مغذی، آب و نور مناسب.

ب- متغیرهای مستقیم^۳: مشخصه‌های محیط زیستی‌اند که اهمیت فیزیولوژیکی برای گونه دارند ولی به‌طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. مانند: دما، pH.

ج- متغیرهای غیرمستقیم^۴: ارتباط فیزیولوژیکی مستقیمی بر عملکرد گونه ندارند. مانند: شیب، جهت، ارتفاع، موقعیت توپوگرافی، نوع زیستگاه، زمین‌شناسی.

لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل در نرم‌افزار Biomapper را می‌توان به دو دسته لایه‌های اطلاعاتی شامل نرم‌افزار Work map و Ecogeographical maps طبقه‌بندی کرد. این لایه‌ها در ابتدا در نرم افزار IDRISI تهیه و تنظیم و سپس به نرم‌افزار Biomapper وارد شوند:

۱- Work map: این نقشه به‌عنوان متغیر وابسته و شامل نقاط حضور گونه مورد مطالعه در سطح منطقه است. این نقاط ابتدا به شکل وکتوری در یک لایه گنجانده و سپس به شکل رستری تبدیل و در نهایت به نقشه بولی تبدیل شد تا به‌عنوان لایه اطلاعاتی وابسته قابل ورود به آنالیز ENFA باشد.

۲- Ecogeographical maps: این نقشه‌ها اطلاعات متغیرهای مستقل زیستگاهی هستند که حضور و یا عدم حضور گونه به آن‌ها بستگی دارد.

با مطالعه رفتارشناسی پایکا در منابع مختلف (Bruggeman, ۲۰۱۱؛ Bruggeman, ۲۰۱۰) و همچنین مشاهدات صحرایی در منطقه مورد مطالعه و منابع قابل دسترس، فاکتورهای عمده‌ای که به‌عنوان متغیرهای محیطی مدنظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارتند از: شیب (بر حسب درجه)، جهت جغرافیایی (به‌صورت درجه از شمال جغرافیایی)، ارتفاع از سطح دریا (بر حسب متر)، درصد پوشش گیاهی، آبراهه، چشمه و نوع خاک منطقه است. همچنین از قالب مدل رقومی ارتفاع^۵ به‌عنوان مرجع استفاده شد تا نقشه‌ها قابلیت روی هم گذاری را داشته باشند.

معرفی گونه: پایکا یا خرگوش موش (*Ochotona rufescens*)

پستاندارانی علف‌خوار متعلق به خانواده پایکاها (Ochotonidae) و راسته خرگوش‌ها (Lagomorpha) می‌باشد. گونه‌های جنس *Ochotona* معمولاً در مناطق سرد و صخره‌ای کوهپایه‌ها زندگی می‌کنند. در ایران طبق گزارش‌های موجود تنها گونه پایکا *O. rufescens* در ارتفاعات داخلی (زاگرس، البرز، هزار مسجد) وجود دارد. جایگاه اصلی این گونه افغانستان است ولی در ارتفاعات ایران، پاکستان و ترکمنستان در ارتفاعات ۱۸۰۰ تا ۳۶۰۰ متر دیده می‌شود (ضیایی، ۱۳۸۷).

روش تحقیق: در این تحقیق از دو نوع داده شامل تصاویر

ماهواره‌ای و داده‌های به‌دست آمده از GPS در طی عملیات میدانی استفاده شده است. در این‌جا از روش ترانسکت خطی تصادفی با روش مشاهده مستقیم با شناسایی نمایه‌های پایکا (سرگین و کپه‌ای گیاهی جمع‌آوری شده توسط پایکا) نمونه‌برداری انجام شد (Beever و همکاران، ۲۰۰۳). این ترانسکت‌ها به‌صورت طولی و در جهت افزایش ارتفاع قرار گرفتند. نقطه شروع نمونه‌برداری به شکل تصادفی انتخاب و ترانسکت‌ها طوری قرار گرفتند که اولاً تمام بخش‌های مورد بررسی را پوشش دهند و ثانیاً تیپ‌ها و پستی بلندی‌های مختلف در طول مسیر را در بر گیرند. به این ترتیب ۹ ترانسکت با مجموع طول ۱۸ کیلومتر طی تابستان و پاییز ۱۳۹۱ مستقر گردید. در طول ترانسکت‌ها به‌منظور به حداقل رساندن همبستگی فضایی بین افراد گونه حداقل ۵۰ متر در نظر گرفته شد (Guo و همکاران، ۲۰۱۲). در داخل هر پلات مختصات نقطه مرکز پلات به کمک GPS ثبت شد. در مجموع ۸۳ پلات نمونه‌برداری جهت انجام آنالیزهای آماری تعیین گردید. اساس تجزیه و تحلیل به‌کار برده شده در این تحقیق را روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای آشپان اکولوژیک (ENFA) تشکیل می‌دهد. در این مطالعه از نرم‌افزار Biomapper برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه و همچنین از نرم‌افزار ادریسی^۱ ۳/۲ برای ساخت لایه‌های اطلاعاتی و ورود آن‌ها به نرم‌افزار Biomapper استفاده شد. مطالعه خصوصیات اکولوژیکی و رفتارشناسی گونه یکی از عوامل مهم در تهیه اطلاعات مورد نظر برای استفاده از روش ENFA است. در این روش نقشه‌هایی با عنوان عوامل مستقل محیطی وارد مرحله تجزیه و تحلیل می‌شوند که با توجه به خصوصیات گونه مورد مطالعه و نیازهای آن در زیستگاه می‌توان این عوامل مستقل محیطی را با توجه به شرایط منطقه مشخص کرد. بدیهی است که برای استفاده از هر


^۲ Resource variables

^۳ Direct variables

^۴ Indirect variables

^۵ Digital Elevation Model (DEM)





شكل ۱: موقعيت جغرافيايى پارک ملی گلستان

يافته و Y : ضريب همبستگى بين داده‌ها و اگر مقدار آن صفر باشد از لگاريتم داده‌ها به‌جاي فرمول بالا استفاده مي‌شود.
 ۲- بررسى ميزان همبستگى داده‌ها: آناليز ENFA در Biomapper نياز به متغيرهايى دارد که با هم همبستگى ندارند. معمولاً توصيه مي‌شود چنان‌چه دو يا چند متغير داراي همبستگى بيش از $0/85$ باشند، حذف يکي از آن‌ها از فهرست متغيرهايى وارد شونده به آناليز ENFA الزامى است. براى اين مرحله، ماتريس همبستگى (Correlation Matrix) نقشه‌ها محاسبه شد. ميزان همبستگى بين متغيرها کم‌تر از ميزان بحراني براى حذف يکي از متغيرها بود، لذا تمامى متغيرها براى آناليز مورد استفاده قرار گرفتند (جدول ۱).

پردازش داده‌ها: قبل از انجام تجزيه و تحليل در نرم‌افزار Biomapper لازم است تا نقشه‌هاي رستري تهيه شده مورد پردازش اوليه قرار گيرند تا قابليت روى هم گذارى و تحليل‌هاي بعدى را داشته باشند. اين پردازش‌ها عبارتند از:
 ۱- بررسى وضعيت نرمال بودن داده‌ها: روش تحليل عاملى آشيان بوم‌شناختى تا حدود زيادى به نرمال بودن داده‌هاي اوليه حساسيت دارد. يکي از بهترين روش‌هاي پيشنهاد شده براى نرمال بودن داده‌ها در Biomapper روش باکس-کاکس (Box-Cox) است.
 تغيير شکل داده‌ها در اين روش با معادله $T(X) = (XY - 1)/Y$ صورت مي‌پذيرد (X : متغير اصلي، $T(X)$: مقدار تغيير شکل

جدول ۱: ماتريس همبستگى متغيرهاي مستقل محيطى

ردیف	جهت	ارتفاع	آبراهه	چشمه	تراکم پوشش گیاهی	شیب	خاک
جهت	۱	-۰/۶۷	۰/۳۲	-۰/۰۸۰	۰/۱۵۰	۰/۰۹۵	۰/۰۷۴
ارتفاع	-۰/۶۷	۱	۰/۳۳۴	۰/۰۱۷	-۰/۱۵۷	-۰/۰۳۵	-۰/۱۱۶
آبراهه	۰/۳۲	۰/۳۳۴	۱	-۰/۰۷۴	-۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۰۴
چشمه	-۰/۰۸۰	۰/۰۱۷	-۰/۰۷۴	۱	-۰/۲۵۷	-۰/۲۵۲	-۰/۱۲۲
تراکم پوشش گیاهی	۰/۱۵۰	-۰/۱۵۷	-۰/۰۱۹	-۰/۲۵۷	۱	۰/۴۳۶	۰/۵۶۰
شیب	۰/۰۹۵	-۰/۰۳۵	۰/۰۱۹	-۰/۲۵۲	۰/۴۳۶	۱	۰/۳۲۲
خاک	۰/۰۷۴	-۰/۱۱۶	۰/۰۰۴	-۰/۱۲۲	۰/۵۶۰	۰/۳۲۲	۱

بخش عمده‌ای از تأثیر متغيرهاي مستقل محيط زيست گونه است.

آناليزهاي انجام شده توسط ENFA مشابه آناليز تجزيه به مؤلفه‌هاي اصلي، به محاسبه عواملى مي‌پردازد که توضيح‌دهنده

توسط فاکتورها تعیین نماید. برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه در نرم افزار Biomapper امکان به کارگیری الگوریتم های متفاوتی شامل الگوریتم میانگین میانه^۶، الگوریتم میانگین هندسی^۷، الگوریتم میانگین هارمونیک^۸ و الگوریتم حداقل فاصله^۹ فراهم شده است. با توجه به این که نتایج حاصل بر مبنای انتخاب و به کارگیری هر الگوریتم متفاوت خواهد بود، لذا انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در نسخه بایومیپر^۴ این امکان فراهم شده است تا با استفاده از شاخص بویس^{۱۰} به توان یک الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه مطلوبیت انتخاب نمود (Boyce, ۲۰۰۶). در مقایسه بین ۴ الگوریتم یاد شده، هرچه میزان این شاخص بیشتر و انحراف معیار (SD) کمتر باشد، نشان دهنده آن است که الگوریتم انتخاب شده مناسبتر است (Hirzel و همکاران، ۲۰۰۶).

تعیین طبقات نقشه مطلوبیت با استفاده از شاخص

Boyce: در نمودار خطی حاصل از به کارگیری شاخص Boyce، محور عمودی (Fi) نشان دهنده نسبت مقدار عددی پیش بینی شده برای هر کلاس (i)، به مقدار مورد انتظار است. بنابراین، هر چه میزان Fi بیشتر باشد نشان دهنده یک مدل خوب است (Boyce و همکاران، ۲۰۰۲). با توجه به نمودار حاصل (شکل ۲)، در جایی که $Fi < 1$ باشد زیستگاه نامطلوب و در مواردی که $Fi > 1$ و به سمت اعداد بالاتر سیر می کند، مطلوبیت زیستگاه نیز افزایش می یابد (Boyce, ۲۰۰۶):

$$Fi = Oi / Ei$$

مقدار شاخص Boyce از -۱ تا +۱ متغیر است. مقادیر مثبت نشان دهنده مدلی است که محاسبه آن به واسطه نقاط پراکنش حضور گونه در آنالیز داده ها استفاده می شود و مقادیر نزدیک به صفر نمایانگر یک مدل تصادفی است. مقادیر منفی نیز نشان دهنده نواحی از زیستگاه با کیفیت پایین است. گونه مورد نظر از این نواحی استفاده نمی برد و صرفاً به عنوان محل رفت و آمد و گذر حیوان می باشد (Hirzel و همکاران، ۲۰۰۶).
به منظور مقایسه نتایج حاصل از ENFA در نرم افزار Biomapper، می توان از حساسیت سنجی مدل نسبت به فاکتورهای متعدد محیطی استفاده نمود.

ماتریس امتیازات^۱ میزان حاشیه گرایی^۲ و تخصص گرایی^۳ پایکا را در زیستگاه های مختلف این منطقه نشان می دهد. ستون اول این جدول نشان دهنده میزان حاشیه گرایی پایکا در منطقه و به معنای فاصله بوم شناختی میانگین پراکنش پایکا در هر متغیر بوم شناختی تا میانگین همان متغیر در سطح کل منطقه مورد مطالعه است (Hirzel و همکاران، ۲۰۰۶). این نمایه از رابطه $M = |mg - ms| / \sqrt{96SG}$ محاسبه می گردد. در این رابطه میانگین توزیع گونه، میانگین توزیع عمومی و انحراف استاندارد توزیع عمومی است. مقادیر مثبت این نمایه نشان دهنده آن است که پایکا زیستگاهی را ترجیح می دهد که دارای مقادیر بیشتری از متغیر مربوطه نسبت به میانگین کل این متغیر در سطح منطقه است. به عبارت دیگر این عمل بیان می کند که آیا گونه مورد مطالعه زیستگاه های کرانه ای را برگزیده و یا این که در محدوده میانی از گستره منابع مورد استفاده خود زیست می کند. هم چنین عامل تحمل پذیری کل^۴ جهت تعیین تحمل پذیری (یا به عبارت دیگر تخصصی بودن گونه) در محدوده منابع مورد استفاده خود در زیستگاه محاسبه شد. این فاکتور در واقع معکوس میزان تخصصی بودن گونه است، به طوری که مقدار کم آن نشان دهنده یک گونه با توان تحمل پایین در محدوده شرایط محیطی خود است. به عبارت دیگر این دسته از گونه ها دارای آشیان بوم شناختی کم عرض بوده و به زندگی در محدوده باریکی از شرایط محیطی خود تمایل بیشتری دارند.

پس از اجرای تحلیل ENFA و دستیابی به خروجی های مربوطه می توان به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت. گام اول در محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه محاسبه Factor map است. نتایج این تحلیل برای محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه الزامی است. نکته حائز اهمیت در این تحلیل تعیین تعداد نقشه های ENFA وارد شونده به تحلیل مطلوبیت زیستگاه (Habitat suitability) است. در تحلیل Factor map، کاربر تعیین می کند چند نقشه ENFA طی این تحلیل تولید گردد. البته Biomapper خود نیز براساس معیار چوب شکسته مک-آرتور^۵ تعداد نقشه های ENFA را پیشنهاد می کند لیکن کاربر می تواند خود این تعداد را براساس مقدار تجمعی واریانس توجیه شده

۶ Median mean

۷ Geometric mean

۸ Harmonic mean

۹ Minimal distance

۱۰ Boyce

۱ Score Matrix


۲ Marginality

۳ Specialization

۴ Global Tolerance

۵ Mc-Arthur





شکل ۲: طبقه‌بندی مطلوبیت زیستگاه براساس نمودار حاصل از شاخص بویس

عمر گله در گرایش حداکثر سود و در گرایش حداقل هزینه به شرح جدول ۱ به دست آمد:

تحلیل پارامترهای آشیان بوم‌شناختی (ENFA): با توجه به ماتریس امتیازات (جدول ۲) میزان حاشیه‌گرایی برای پایکا در این منطقه ۰/۶۶ محاسبه شد. از آن‌جاکه مقدار کم (نزدیک به صفر) این عامل نشان دهنده مرکز‌گرایی و مقادیر نزدیک به ۱ بیانگر حاشیه‌گزینی گونه مربوطه در محدوده منابع مورد استفاده است، لذا میزان محاسبه شده برای پایکا نشان دهنده این است که این جانور تمایل به زندگی در زیستگاه‌های حاشیه‌ای دارد. مقدار عامل تحمل‌پذیری کل برای پایکا در پارک ملی گلستان ۰/۴۲۸ و تقریباً در میانه محدوده معرفی شده (۱-۰) می‌باشد و بیانگر این است که گونه مورد مطالعه از نظر تخصصی بودن در محدوده منابع مورد استفاده خود در زیستگاه تقریباً حد میانه را حفظ می‌کند. به عبارتی دیگر، گونه مورد مطالعه دارای آشیان بوم‌شناختی چندان کم عرض نیست و به زندگی در محدوده میانه‌ای از شرایط محیطی تمایل بیشتری دارد.

بدین منظور ابتدا با به‌کارگیری Logistic Regression و وارد نمودن نقشه حضور گونه به‌مراه ۷ فاکتور مستقل محیطی، نتیجه‌ای حاصل گردید که براساس آن هر چه عدد R-Square به سمت ۰/۲ (Clark و Hosking، ۱۹۸۶) و عدد ROC (Relative Operating Characteristic) به سمت ۱ گرایش یابد نشان دهنده صحت مدل است (Schneider و Pontius، ۲۰۰۱). برای تعیین حساسیت مدل نسبت به هر یک از فاکتورهای وارد شده به تحلیل و مشخص نمودن عواملی که بیش از بقیه در ساخت مدل و نتایج حاصله، نقش دارند می‌توان از تحلیل حساسیت و مقایسه فاکتورهای مختلف استفاده نمود. بدین منظور با بهره‌گیری از Logistic Regression، به تعداد فاکتورهای محیطی، هفت بار تحلیل مربوطه اجرا می‌گردد و در هر نوبت یکی از فاکتورها از تحلیل حذف می‌شود تا نتیجه حاصله در غیاب آن عامل با نتیجه کلی مقایسه گردد.

نتایج

معادلات صفات تولیدی: معادلات ضریب اقتصادی تولید

شیر به‌همراه ضریب اقتصادی درصد چربی و پروتئین و طول

جدول ۲: ماتریس امتیازات متغیرهای مستقل زیست محیطی

متغیرهای مستقل	عامل اول	عامل دوم	عامل سوم	عامل چهارم	عامل پنجم	عامل ششم	عامل هفتم
زیست محیطی	۱۰۰٪ حاشیه‌گرایی	۴۰٪ تخصیص گرابی	۵٪ تخصیص گرابی	۳٪ تخصیص گرابی	۲٪ تخصیص گرابی	۱٪ تخصیص گرابی	۱٪ تخصیص گرابی
جهت	-۰/۰۴۶	۰/۰۷۳	۰/۳۸۹	-۰/۰۶۳۵	۰/۵۴۰	-۰/۱۳۷	-۰/۰۴۱
ارتفاع	-۰/۲۰۱	-۰/۰۹۰۲	۰/۱۲۱	-۰/۱۵۳	۰/۰۶۴	۰/۲۶۵	۰/۲۰۸
آبراهه	۰/۲۲۵	۰/۱۱۷	-۰/۰۴۲	۰/۲۱۰	۰/۱۷۳	۰/۳۵۰	-۰/۷۴۳
چشمه	۰/۳۵۴	-۰/۳۹۸	-۰/۵۲۵	-۰/۰۳۱	۰/۱۷۷	-۰/۷۱۵	-۰/۲۷۲
تراکم پوشش گیاهی	-۰/۸۴۱	۰/۰۵۹	-۰/۲۴۶	-۰/۰۹۵	-۰/۱۷۴	-۰/۲۰۷	-۰/۴۳۰
شیب	-۰/۲۵۴	۰/۰۲۹	-۰/۳۴۸	۰/۵۰۳	۰/۷۶۴	-۰/۰۰۶	۰/۳۱۱
خاک	۰/۰۹۵	-۰/۰۶۹	-۰/۶۱۲	-۰/۵۱۵	-۰/۱۷۱	۰/۴۸۳	۰/۲۱۷

حاشیه‌گرایی: ۰/۶۶۰

تخصیص گرابی: ۲/۳۳۴

(۱/۵): تحمل‌پذیری کل: ۰/۴۲۸



تعیین الگوریتم مناسب با استفاده از شاخص Boyce:

در این مطالعه، با مقایسه اعداد حاصل (جدول ۴)، الگوریتم هندسی انتخاب شد. نقشه خروجی مطلوبیت زیستگاه شامل یک نقشه پیوسته از ارزش‌ها بین بازه ۰ تا ۱۰۰ است که هرچه به مقدار ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد مطلوبیت افزایش می‌یابد. در نتیجه طبقاتی با شماره بالاتر دارای مطلوبیت بیش‌تری هستند. به‌منظور درک بهتر و استفاده راحت‌تر از نقشه حاصل، براساس به‌کارگیری شاخص Boyce تعداد ۳ طبقه برای نقشه مطلوبیت زیستگاه تعیین شد (شکل ۳). شکل ۴، نقشه طبقه‌بندی شده مطلوبیت زیستگاه پایکا را در پارک ملی گلستان نشان می‌دهد. طبق نتایج حاصله، بیش‌ترین مساحت مربوط به کلاس ۱ (زیستگاه نامطلوب) و کم‌ترین متعلق به کلاس ۳ (زیستگاه مطلوب) می‌باشد.

ستون اول در جدول ۲ به تنهایی ۱۰۰٪ از حاشیه‌گرایی و ۴۷٪ از تخصص‌گرایی را بیان می‌کند و ستون‌های بعدی به ترتیب ۴۰٪، ۵٪، ۳٪، ۲٪، ۱٪ و ۱٪ تخصص‌گرایی را نشان می‌دهند.

تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه (Habitat suitability map):


در این مطالعه تعداد نقشه ENFA حاصل از تحلیل Factor map برای محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه ۳ نقشه در نظر گرفته شد. به‌عبارت دیگر کلیه اطلاعات مربوط به تمامی فاکتورهای محیط زیستی مورد استفاده در آنالیز در ۳ نقشه خلاصه شده که در مجموع حاوی ۹۶٪ از کل اطلاعات می‌باشند. مقادیر موجود در جدول ۳ نشان‌دهنده سهم هر یک از نقشه‌های ENFA بر حسب درصد در ساخت نقشه مطلوبیت زیستگاه می‌باشد.

جدول ۴: مقایسه شاخص بویس در الگوریتم‌های مختلف


ردیف	الگوریتم	انحراف معیار \pm شاخص بویس
۱	میانه	0.468 ± 0.2965
۲	هارمونیک	0.737 ± 0.3205
۳	هندسی	0.877 ± 0.1726
۴	حداقل فاصله	0.64 ± 0.3133

جدول ۳: میزان اطلاعات نقشه‌های ENFA

نقشه	میزان اطلاعات	درصد اطلاعات
ENFA-01_ST	۱/۴۶۸	۷۳/۲۴
ENFA-02_ST	۰/۴۰۲	۲۰/۰۵
ENFA-03_ST	۰/۰۵۴	۲/۶۹
جمع	۱/۹۲۴	۹۶/۰۰



شکل ۴: طبقه‌بندی مطلوبیت زیستگاه (مطلوب، بینابینی و نامطلوب)



شکل ۳: مطلوبیت زیستگاه پایکا در پارک ملی گلستان

ارزیابی صحت پیش‌بینی مدل برآورد شده از طریق شاخص Boyce: در این مطالعه همان‌طور که از جدول ۳ مشخص است، مقادیر شاخص بویس به سمت ۱ گرایش دارد و در الگوریتم به‌کار گرفته شده نیز میزان این شاخص ۸۷٪ به‌دست آمد که این مقدار نشان‌دهنده صحت قابل قبول مدل است.

آزمون حساسیت در نرم‌افزار Idrisi: براساس نتایج حاصله از Logistic Regression، فاکتورهای محیطی شامل: شاخص پوشش گیاهی، خاک منطقه و ارتفاع، نقش موثر و مهمی در ساخت مدل و ارائه نقشه مطلوبیت زیستگاه پایکا دارند (جدول ۵).



مى‌کنند، شناخته مى‌شوند لذا مناطق مرتفع را به علت تنوع گياهى ترجيح مى‌دهند. نقش ديگرى که ارتفاع مى‌تواند داشته باشد، تأثير در ميزان آب شدن برف است. در مناطق مرتفع و دامنه‌هاى که نسبت به شمال جغرافيايى زاويه بيش‌ترى دارند، پوشش برف ديرتر آب مى‌شود و مى‌تواند به‌عنوان عايقى گياهان زيرين را از يخ‌زدگى محافظت کند، هم‌چنين در بهار دير آب شدن برف‌ها در مناطق مرتفع و دامنه‌هاى جنوبى سبب رشد گونه‌هاى متنوع گياهى شده و گياهان را براى مدت زمان بيش‌ترى سرسبز و آبدار نگه مى‌دارد، بنابر اين باعث جذب پاىکاها به اين مناطق مى‌گردد (خاکی‌صحنه و همکاران، ۱۳۹۰). در اين تحقيق نتيجه به‌دست آمده ارزيايى زيستگاه پاىکا مشخص نمود که زيستگاه انتخابى پاىکا در سطح پارک ملی گلستان، مناطقى با پوشش سنگى و صخره‌اى به هم پيوسته که داراى درزها و شکاف‌هاى متعدد مى‌باشد، که اين نتيجه با ساير تحقيقاتى که روى اين گونه صخره‌زى صورت گرفته شبايت زيادى دارد. از جمله مى‌توان به نتايج خاکی‌صحنه و همکاران (۱۳۹۰) که مطلوبيت زيستگاه اين گونه را در منطقه لشگردر استان همدان با روش رگرسيون منطقى دوتايى و HEP و هم‌چنين Haleem و همکاران (۲۰۱۲) که فراوانى و توزيع پاىکا را در آتراخاند هيماليا، هند انجام داده‌اند و Bruggeman (۲۰۱۱) اشاره نمود. ميزان حاشيه‌گرابى، تخصص‌گرابى و تحمل کل در اين مطالعه به ترتيب ۰/۶۶، ۲/۳۳۴ و ۰/۴۲۸ محاسبه شد و نشان دهنده آن است که گونه تمايل به زندگى در زيستگاه‌هاى حاشيه‌اى داشته و از نظر تخصصى بودن در محدوده منابع مورد استفاده خود در زيستگاه تقريباً حد ميانه را حفظ مى‌کند. به‌عبارتى ديگر، داراى آشيان بوم‌شناختى چندان کم عرض نيست و به زندگى در محدوده ميانه‌اى از شرايط محيطى تمايل بيش‌ترى دارد و اين نتيجه بارفتارشناسى و انتخاب زيستگاه پاىکا هم‌خوانى و مطابقت دارد (Richardson, ۲۰۱۲). براساس نتايج حاضر مهم‌ترين عامل در تعيين مطلوبيت زيستگاه پاىکا، شاخص تراکم پوشش گياهى بوده که تأثير منفى بر پراکنش گونه دارد بدین ترتيب که گونه در مناطق جنگلى و نيمه‌جنگلى حضور نداشته و تنها در مناطق مرتفع با پوشش استپى و درختان ارس و کرکو حضور دارد (بر اساس مشاهدات ميدانى و نقاط ثبت شده حضور گونه). پاىکاها به‌واسطه پاهاى کوتاه و پرزهاى کف پا قادر به جابه‌جايى زياد و حرکت روى سطح خاک و مناطقى با تراکم گياهى بالا نيستند (Bruggeman, ۲۰۱۱). علاوه بر NDVI، فاصله از چشمه‌ها و در مرحله بعد عامل شيب نيز به‌عنوان عوامل موثر بر ميزان مطلوبيت زيستگاه در مدل وارد

جدول ۵: مقايسه مقادير حاصل از Logistic Regression

ردیف	فاکتور مستقل محیطی	Pseudo R-Square	Roc
۱	جهت	۰/۱۲۳۱	۰/۸۹۶۵
۲	ارتفاع	۰/۱۱۰۸	۰/۸۷۲۰
۳	آبراهه	۰/۱۱۳۲	۰/۸۹۲۶
۴	چشمه	۰/۱۲۰۷	۰/۸۹۸۸
۵	تراکم پوشش گياهى	۰/۰۲۸۴	۰/۶۷۹۳
۶	شيب	۰/۱۲۰۴	۰/۸۹۵۳
۷	خاک	۰/۰۰۹۱۴	۰/۸۵۸۷
۸	سرى کامل داده‌ها	۰/۱۲۳۱	۰/۸۹۶۸

جدول ۶: خلاصه نتايج تحليل عاملى آشيان بوم‌شناختى و

رگرسيون لجستىک

تحليل عاملى آشيان بوم‌شناختى	رگرسيون لجستىک
شاخص پوشش گياهى	شاخص پوشش گياهى
چشمه	خاک
شيب	ارتفاع
آبراهه	آبراهه
ارتفاع	شيب

عوامل مؤثر بر مطلوبيت زيستگاه پاىکا به ترتيب کاهش ميزان اهميت مرتب شده‌اند.

بحث

نتايج حاصل از تحليل عاملى آشيان بوم‌شناختى (ENFA) براى پاىکا در پارک ملی گلستان براساس متغيرهاى مستقل زيستگاهى مورد استفاده نشان مى‌دهد که زيستگاه مطلوب پاىکا در اين منطقه به‌طور ميانگين در ارتفاع ۱۳۲۵ متر از سطح دريا و در شيب‌هاى ۲۱ درجه، جهت جنوبى، خاک‌هاى لومى، تراکم پوشش گياهى ۱۳ درصد و فواصل ۲۲۹۱ و ۳۰۵۴ متری از آبراهه و چشمه‌ها قرار داشته به‌طوري‌که بيش‌ترين بخش از زيستگاه مطلوب در مناطق کوهستانى و صخره‌اى قرار دارد. درباره علت انتخاب اين عوامل زيستگاهى توسط گونه با توجه ساير تحقيقاتى که در مورد پاىکاها صورت گرفته است (Bruggeman, ۲۰۱۰) مشخص مى‌گردد که يکى از عوامل اصلى در انتخاب زيستگاه توسط پاىکاها ساختار پوشش زمين است. پاىکاها از صخره‌ها هم به‌عنوان لانه و گريزگاه در برابر شکارچيان استفاده مى‌کنند (Guo و همکاران، ۲۰۱۲). از آن‌جا که پاىکاها به‌عنوان پستانداران علف‌خوارى که اقدام به جمع‌آورى کپه‌هاى گياهى



صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۸.

۲. **خاکی صحنه، س.؛ عزیززاده شعبانی، ا.؛ میرسنجری، م.؛ کابلی، م.؛ نوری، ز. و فتاحی، ب.**، ۱۳۹۰. ارزیابی زیستگاه پایکای افغانی (*Ochotona rufescens*) با استفاده از روش‌های رگرسیون منطقی دتایی و HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال ۳، شماره ۳، صفحات ۱ تا ۱۰.
۳. **درویش‌صفت، ع.**، ۱۳۸۵. اطلس مناطق حفاظت شده. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۵۷ صفحه.
۴. **ضیایی، ه.**، ۱۳۸۷. راهنمایی صحرایی پستانداران ایران. انتشارات کانون آشنایی با حیات وحش. ۱۹۱ صفحه.
۵. **فلاح‌باقری، ف.؛ کابلی، م. و فراشی، آ.**، ۱۳۸۸. ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اصفهانی (*Ovis orientalis isfahanica*) در پارک ملی کلاه قاضی با روش ENFA. همایش و نمایشگاه ژئوماتیک. سازمان نقشه برداری کشور. تهران. ۷ صفحه.
۶. **فراشی، آ.؛ کابلی، م. و فلاح‌باقری، ف.**، ۱۳۸۸. کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات حیات وحش. همایش و نمایشگاه ژئوماتیک. سازمان نقشه برداری کشور. تهران. ۱۰ صفحه.
۷. **مجنوبیان، ه.؛ زاهد، ب.؛ حسن‌زاده کیایی، ب.؛ فرهنگ دره‌شوری، ب. و گشتاسب‌میگونی، ح.**، ۱۳۷۸. پارک ملی گلستان (ذخیره‌گاه زیست‌کره). سازمان حفاظت محیط زیست. تهران. ۱۲۹ صفحه.
۸. **ملکی‌نجف‌آبادی، س.؛ همامی، م.؛ سلمان‌ماهینی، ع. و راهداری، و.**، ۱۳۸۹. استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی جهت مدیریت زیستگاه حیات وحش: مطالعه موردی قوچ و میش اصفهانی (*Ovis orientalis isfahanica*) در پناهگاه حیات وحش موته. همایش ملی ژئوماتیک. سازمان نقشه برداری کشور. تهران. ۱۰ صفحه.
9. **Anderson, M.C.; Watts, J.M.; Freilich, J.E.; Yool, S.R.; Wakefield, G.I.; Mccauley, J.F. and Fahnestock, A., 2000.** Regression-tree modeling of desert tortoise habitat in the central Mojave. Ecological Applications. Vol. 10, No. 3, pp: 890-900.
10. **Anderson, R.P. and Meyer, E.M., 2004.** Modeling species' geographic distributions for preliminary conservation assessments: an implementation with the spiny pocket mice (*Heteromys*) of Ecuador. Biological Conservation. Vol. 116, No. 2, pp: 167-179.
11. **Beever, E.A.; Brussard, P.F. and Berger, J., 2003.** Patterns of apparent extirpation among isolated populations of pikas (*Ochotona princeps*) in the Great Basin. J. Mamm. Vol. 84, pp: 37-54.
12. **Boyce, M.S., 2006.** Scale for resource selection functions. Diversity Distrib. Vol. 12, No. 3, pp: 269-276.
13. **Boyce, M.S.; Vernier, P.R.; Nielsen, S.E. and Schmiegelow, F. K., 2002.** Evaluating resource selection functions. Ecology. Vol. 157, pp: 281-300.

شده‌اند (جدول ۶). این درحالی است که خاکی‌صحنه و همکاران (۱۳۹۰)، ساختار پوشش زمین را به‌عنوان مهم‌ترین عامل محیطی موثر بر انتخاب زیستگاه پایکا معرفی نمودند. هم‌چنین عامل فاصله از آبراهه نیز دیگر عامل معنی‌دار وارد شده در مدل می‌باشد. از آن‌جاکه زیستگاه پایکا مناطقی با پوشش سنگی و صخره‌ای به‌هم پیوسته که دارای درزها و شکاف‌های متعدد می‌باشد لذا پایکاها برای جلوگیری از آب‌گرفتگی لانه از مسیر آبراهه‌ها فاصله می‌گیرند. از دیگر عوامل وارد شده در مدل عامل شیب است. با توجه به این که زیستگاه گونه در مناطق مرتفع و کوهستانی قرار دارد به‌نظر می‌رسد شیب نیز به‌عنوان یک عامل تحت تأثیر شرایط زیستگاهی وارد مدل شده است (جدول ۶).

بنابراین می‌توان گفت نتایج حاصل با نتایج مطالعه Haleem و همکاران، (۲۰۱۲) و Bruggeman (۲۰۱۱) مطابقت دارد. در بررسی صحت مدل، با دقت در نتایج به‌دست آمده و درنظر گرفتن موارد مطرح شده در تحلیل حساسیت و نیز عدد R^2 (ضریب همبستگی اسپیرمن) می‌توان صحت مدل و دقت آن را تایید نمود (جدول ۵). در این‌جا نیز عامل تراکم پوشش گیاهی، خاک منطقه و ارتفاع به‌ترتیب از مهم‌ترین عوامل در پراکنش گونه انتخاب شده که فاکتور پوشش گیاهی تأثیر منفی بر پراکنش گونه دارد (جدول ۵). در پایان لازم به توضیح است استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) نیاز به وارد نمودن حجم زیادی از اطلاعات نسبتاً دقیق از متغیرهای زیستگاهی به‌صورت لایه‌های رستری در نرم‌افزار دارد.

لذا به‌کارگیری این روش برای دست‌یابی به مطلوبیت زیستگاه بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران به سختی امکان‌پذیر است، زیرا بانک اطلاعاتی جامعی از گونه‌های مختلف حیات وحش در مناطق متنوع ایران همراه با لایه‌های اطلاعاتی صحیح از متغیرهای زیستگاهی آن‌ها هنوز ایجاد نشده است و این امر مستلزم صرف وقت و هزینه جهت انجام مطالعات اولیه و جمع‌آوری داده‌های معتبر می‌باشد.

منابع

۱. **امیدی، م.؛ کابلی، م.؛ کرمی، م.؛ سلمان‌ماهینی، ع. و حسن‌زاده کیایی، ب.**، ۱۳۸۸. مدل‌سازی زیستگاه پلنگ ایرانی (*Panthera pardus saxicolor*) به‌روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی کلاه قاضی، استان اصفهان. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ۱۲، شماره ۱،



14. **Bruggeman, J.B., 2010.** Pilot study on factors affecting pika population in the north cascades ecosystem. Final report. Beartooth Wildlife Research, California Press, Berkeley, California, USA. 197 p.
15. **Bruggeman, J.B., 2011.** Factors Affecting Pika Populations In The North Cascades National Park Service Complex. Beartooth Wildlife Research, LLC 700 Ninth Street Farmington, Minnesota 55024. 213 p.
16. **Clark, W.A. and Hosking, P.L., 1986.** Statistical Methods for Geographers, Chapter13. New York: John Wiley & Sons. 135 p.
17. **Guisan, A. and Zimmermann, N.E., 2000.** Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling. Vol. 135, pp: 147-186.
18. **Guo, Z.G.; Li, X.F.; Liu, X.Y. and Zhou, X.R., 2012.** Response of alpine meadow communities to burrow density changes of plateau pika (*Ochotona curzoniae*) in the Qinghai-Tibet Plateau. Acta Ecologica Sinica. Vol. 32, PP: 44-49.
19. **Haleem, A.; Ilyas, O.; Syed, Z. and Arya, S.K., 2012.** Abundance and distribution of Royle's Pika (*Ochotona roylei*) along different altitudinal ranges of Kedarnath Wildlife Sanctuary, Uttarakhand Himalayas, India. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT) ISSN: 2319-2402, ISBN: 2319-2399. Vol. 1, No. 2, pp: 13-16.
20. **Hirzel, A.H.; Lay, G.L.; Helfer, V.; Randin, C. and Guisan, A., 2006.** Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. Ecological Modelling. Vol. 199, pp: 142-152.
21. **Hirzel, A. and Guisan, A., 2002.** Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability modeling. Ecological modeling. Vol. 157, pp: 331-341.
22. **Master, F.M.; Ferreira, J.P. and Mira, A., 2007.** Modeling the distribution of the European Polecat *Mustela putorius* in a Mediterranean agricultural landscape, Revue d'Ecologie (Terre Vie). Vol. 62, pp: 35-47.
23. **Morrison, M.L.; Marcot, B.G. and Mannan, R.W., 1992.** Wildlife-habitat relationships: Concepts and applications. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, USA. 147 p.
24. **Olivier, F. and Witherspoon, S.J., 2006.** Modelling habitat selection using presence-only data: Case study of a colonial hollow nesting bird, the snow petrel. Ecological modeling. Vol. 195, pp: 187-204.
25. **Pontius, R.G.J. and Schneider, L., 2001.** Land-use change model validation by a ROC method for the Ipswich watershed, Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems & Environment. Vol. 85, No. 1-3. pp: 239-248.
26. **Richardson, R.M., 2012.** Factors Influencing Pika Foraging Behavior in North Cascades National Park Service Complex, Washington. Division of Biological Sciences, University of Montana, Missoula, MT, 59812, USA. 139 p.

