

## مقایسه توانایی دو گونه کرم خاکی *Dendrobaena veneta* و *Eisenia fetida* در تولید ورمی کمپوست

• **مجتبی یحیی آبادی\***: بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران، صندوق پستی: ۸۱۷۸۵-۱۹۹

تاریخ دریافت: آذر ۱۳۹۵ تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۵

### چکیده

مقایسه دو گونه کرم خاکی *Dendrobaena veneta* و *Eisenia fetida* در تولید ورمی کمپوست از دو ماده آلی کمپوست زباله شهری و کود گاو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون T نشان داد اختلاف در افزایش نیتروژن در هر دو بستر توسط دو گونه کرم معنی دار نبوده است. فسفر کل در محصول نهایی ورمی کمپوست در هر دو بستر افزایش داشته است ( $p < 0/05$ )، اما اختلاف فعالیت دو گونه کرم خاکی در افزایش فسفر در ورمی کمپوست کود گاو از نظر آماری معنی دار نبوده و در ورمی کمپوست زباله شهری معنی دار بوده ( $p < 0/05$ ) و از این رو، گونه آیزنیا فتیدا عملکرد بهتری از خود نشان داده است. در بستر کود گاو اختلاف آماری معنی داری در میانگین بیشترین تعداد کرم در دو گونه، وجود ندارد همچنین اختلاف دو گونه کرم خاکی از نظر میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز نیز معنی دار است ( $p < 0/05$ ). مقایسه صفات زیستی دو گونه کرم خاکی در بستر کمپوست زباله نشان می دهد با وجودی که اختلاف دو گونه از نظر میانگین کلی تعداد کوکون، میانگین تعداد کوکون برای هر کرم و میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز، معنی دار است ( $p < 0/05$ ) و *E. fetida* عملکرد بهتری از خود نشان داده است، با این حال دو گونه از نظر میانگین بیشترین تعداد کرم، اختلاف معنی داری ندارند. در مجموع کرم های *E. fetida* سرعت رشد بیشتری دارند و چرخه تکثیر آن ها کوتاه تر است. نتایج نشان داد کرم های خاکی *D. veneta* شباهت زیستی زیادی با *E. fetida* دارد و قابلیت مناسب این گونه باعث می شود تا بتوان از این کرم خاکی نیز در فرآیند تولید ورمی کمپوست استفاده نمود.

**کلمات کلیدی:** کرم های خاکی، اپی جیبک، کود گاو، کمپوست زباله



## مقدمه

مدیریت پسماندهای آلی با هدف تأمین کودهای سازگار با محیط زیست و در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، مورد توجه بسیاری از محققین علوم کشاورزی و محیط زیست قرار گرفته است. در فرآیند تولید ورمی کمپوست (Vermicomposting)، مواد آلی با ساختار پیچیده و غنی از انرژی، با استفاده از کرم‌های خاکی به یک ماده هوموسی شکل و پایدار تبدیل می‌شود (Benitez و همکاران، ۲۰۰۰). این فرآیند، پتانسیل تبدیل بقایای آلی مانند لجن فاضلاب، بقایای گیاهی، پسماندهای کشاورزی، خانگی، صنایع غذایی و فضولات حیوانات را دارد (یحیی آبادی، ۱۳۹۱). در واقع تولید ورمی کمپوست، نوعی اکسیداسیون زیستی و تثبیت مواد آلی با مشارکت کرم‌های خاکی و میکروارگانیسم‌ها محسوب می‌شود. اگرچه میکروارگانیسم‌ها مسول تجزیه بیوشیمیایی مواد آلی هستند، با این حال کرم‌های خاکی محرک‌های اصلی این فرآیند به حساب می‌آیند و در تأمین شرایط لازم برای فعالیت‌های زیستی نقش بسیار مهمی دارند (Ayra و همکاران، ۲۰۰۲). بیش از ۳۵۰۰ گونه کرم خاکی در جهان شناسایی شده‌اند و تخمین زده می‌شود که بررسی‌های بیشتر، این رقم را باز هم افزایش دهند. فراوانی نسبی و ترکیب جمعیتی جانوران بومی خاک به‌طور کلی بستگی به خاک، آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع کاربری خاک و هم‌چنین هجوم گونه‌های غیربومی دارد (Hale و همکاران، ۲۰۰۰). انتخاب و گسترش برخی از گونه‌های خاص کرم‌های خاکی (به‌منظور تولید ورمی کمپوست)، موجب کاهش تنوع زیستی گونه‌های بومی در زیستگاه‌های خود شده و نقش مثبت آن‌ها را کم‌رنگ می‌کنند. از نظر زیستگاه اکولوژیک، کرم‌های خاکی را به سه دسته عمده Epigeic، Endogeic و Anecic تقسیم‌بندی می‌کنند (Lee، ۱۹۸۵). کرم‌های Epigeic، عمدتاً از توده‌های کمپوست، لاشبرگ‌های سطحی و کودهای دامی و بقایای گیاهی و حیوانی تازه فاسد شده تغذیه می‌کنند. از کرم‌های خاکی این گروه اپی‌جئیک، می‌توان به گونه‌های *Eisenia fetida* و *Lumbricus rubellus* اشاره کرد. کرم‌های خاکی گروه Endogeic، انواعی هستند که در قسمت‌های عمقی خاک زندگی می‌کنند و از خاک تغذیه کرده و عناصر غذایی را از مواد آلی تجزیه شده تأمین می‌کنند. در این گروه می‌توان به گونه‌های *A. rosea* و *A. caliginosa* اشاره کرد. کرم‌های خاکی گروه Anecic، از کرم‌های حفار هستند و در شب برای تغذیه بقایای تازه فاسد شده به سطح می‌آیند یعنی از سطح تا عمق خاک رفت و آمد می‌کنند. از این گروه می‌توان به گونه *A. longa* اشاره کرد. کرم‌های خاکی گروه اپی‌جئیک از مواد آلی و کودهای دامی تغذیه می‌کنند و با بلع مواد آلی و دفع آن‌ها از طریق سیستم گوارش خود موجب تولید کودی می‌گردند که

از نظر عناصر غذایی غنی بوده و از دانه‌بندی مناسبی نیز برخوردار می‌باشند (Bowman، ۱۹۹۲). بسیاری از گونه‌های کرم‌های خاکی برای تولید ورمی کمپوست استفاده شده‌اند، ولی کرم‌های گروه اپی‌جئیک، به دلیل مقاومت به تغییر شرایط محیطی و سرعت زیاد تغذیه و تکثیر، در واحدهای بزرگ تجاری پرورش داده می‌شوند (Kilpin و Baker، ۱۹۹۲). برخی از این گونه‌ها مانند *Eisenia fetida* بسیار شناخته شده هستند و در بازیافت پسماندهای آلی از آن‌ها استفاده می‌شود (Loh و همکاران، ۲۰۰۵). هر یک از گونه‌های کرم‌های خاکی به‌خاطر خصوصیتی از قبیل اختلاف در سازگاری با شرایط دمایی گوناگون، اختلاف در توانایی تبدیل مواد آلی به ورمی کمپوست، تفاوت در نحوه پرورش و برداشت و پاره‌ای از صفات دیگر از سایر گونه‌ها متمایز هستند. Edwards و همکاران (۱۹۸۸) معتقدند که هر یک از گونه‌های کرم‌های اپی‌جئیک از نظر قدرت تولیدمثل، شرایط دمایی و تبدیل مواد آلی به ورمی کمپوست باهم متفاوت می‌باشند. در استرالیا، مهم‌ترین گونه مورد استفاده برای تولید ورمی کمپوست، گونه *Eisenia fetida* است که به دلیل سرعت رشد و تکثیر و پتانسیل کافی برای مصرف انواع مواد آلی زاید، بیش از سایر گونه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور هند، تولید ورمی کمپوست، بیش‌تر با استفاده از گونه‌های محلی از گونه *Metaphire posthuma* و گونه *Amyntas Morrissi* انجام گرفته‌است (Edwards و Bohlen، ۱۹۹۶). گونه *Eisenia andri* نیز در بعضی از کشورهای آسیای میانه برای تهیه ورمی کمپوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از معیارهای مهم گونه‌های برتر کرم‌ها، سرعت تکثیر آن‌هاست. سرعت تکثیر کرم‌های کمپوستی بسیار زیاد است و تکثیر از طریق جنسی و تخم‌گذاری صورت می‌گیرد. هاشمی‌مجد (۱۳۸۲)، در برخی از مناطق شمالی ایران اقدام به شناسایی گونه‌های *Eisenia fetida* کرده و توان این گونه در تولید ورمی کمپوست را مورد ارزیابی قرار داد. اکثر کرم‌های کمپوستی جمع‌آوری شده در تحقیق وی، متعلق به گونه *Eisenia fetida* بودند. کرم‌های فوق برای تولید ورمی کمپوست از کود دامی، بقایای گیاهی و باگاس نیشکر قابلیت خوبی داشته و در بستر کشت، هر کرم در هفته یک تا دو کوکون تولید کرده و در هر کوکون دو الی هفت عدد نوزاد کرم وجود داشت. در آزمایشی (Mackey و Kladviko، ۱۹۸۵) از کرم‌های خاکی اپی‌جئیک برای سرعت بخشیدن به تجزیه بقایای ذرت در زمین استفاده کردند و گزارش کردند که در عدم وجود این کرم‌ها، سرعت تجزیه به یک پنجم کاهش می‌یابد. Carica و همکاران (۱۹۹۵)، معتقدند میزان فعالیت آنزیمی در کرم‌های خاکی اپی‌جئیک بیش‌تر از کرم‌های اندوجئیک است. کرم‌های خاکی اپی‌جئیک به دلیل قابلیت تکثیر زیاد، سیستم آنزیمی قوی در تجزیه ضایعات کشاورزی و زباله‌های شهری و لجن فاضلاب، علاوه بر تولید کودهای

گلدان‌های حاوی کود به مدت یک هفته نگهداری شدند تا از نظر دمایی و شرایط فیزیکی و بیولوژیکی آماده پذیرش کرم‌ها شوند. پس از این مدت، از هر گونه کرم بالغ، بیست عدد انتخاب و توزین (با وزن تقریبی  $200 \pm 10$  میلی‌گرم) و در گلدان‌ها تلقیح شدند. گلدان‌ها در محل تاریک و در شرایط دمایی ۲۵-۲۸ درجه نگهداری شدند. از ابتدای آزمایش، هر پانزده روز یکبار (تا ۱۳۵ روز)، صفاتی مانند وزن زنده کرم‌ها (بیوماس)، نرخ رشد کرم‌ها، تعداد کرم‌ها و تعداد کوکون تولید شده در بسترها اندازه‌گیری شدند (Suthar, ۲۰۰۷). از آزمون T جفت شده برای نشان دادن وجود اختلاف معنی‌دار ( $P < 0.05$ ) بین خصوصیات شیمیایی ورمی‌کمپوست تولید شده توسط دو گونه کرم خاکی و همچنین بین خصوصیات تکثیر دو گونه کرم، استفاده شد. برای این کار، از نرم‌افزار آماری Minitab ۱۶ استفاده گردید. از فرمول زیر برای محاسبه نرخ رشد کرم‌ها استفاده شد (Suthar, ۲۰۰۷):

$$R = (N_2 - N_1) / T$$

که در آن R نرخ رشد کرم (روز/کرم/میلی‌گرم)،  $N_2$ : وزن نهایی کرم (میلی‌گرم)،  $N_1$ : وزن اولیه کرم (میلی‌گرم) و T: زمان طی شده (روز)

## نتایج

خصوصیات شیمیایی بسترهای مختلف برای تهیه ورمی‌کمپوست در جدول ۱ آمده است. نتایج بیانگر آن است که کرم‌ها توانسته‌اند در ورمی‌کمپوست حاصله، تغییرات مهمی در ماهیت شیمیایی کود گاو و کمپوست زباله ایجاد کنند. در این فرآیند، کرم‌های خاکی ضمن ایجاد شرایط هوازی در بقایای آلی، بخشی از مواد آلی را به وزن زنده خود و بخشی را به مواد ترش‌تری تبدیل کرده و باقی‌مانده را از دستگاه گوارش خود دفع کرده‌اند که مواد ورمی‌کمپوست را تشکیل می‌دهند. در این تحقیق نشان داده شد که pH مواد اولیه پس از فرآیند توسط کرم‌ها، کاهش یافته است. تغییر کاهش pH در کود گاو به حدود ۵/۳ درصد برای گونه *E. fetida* تا ۱۵ درصد برای گونه *D. veneta* می‌رسد و در کمپوست زباله به ۹/۹ درصد برای گونه *D. veneta* و ۵/۸ درصد برای گونه *E. fetida* می‌رسد. جدول ۲ نشان می‌دهد که اختلاف دو گونه در کاهش کربن آلی در کود گاو معنی‌دار و در کمپوست زباله غیر معنی‌دار است ( $p < 0.05$ ). نسبت C/N در محصول نهایی ورمی‌کمپوست یکی دیگر از خصوصیات اندازه‌گیری شده بود. همان‌گونه که انتظار می‌رفت نسبت فوق در هر دو بستر کاهش یافت. بیش‌ترین کاهش در ورمی‌کمپوست کود گاو و توسط کرم‌های گونه *D. veneta* ( $61.4\%$ ) و گونه *E. fetida* ( $56\%$ ) مشاهده شد. آزمون T نیز نشان داد که کارایی کرم‌های گونه *D. veneta* در کاهش نسبت C/N مقایسه با کرم‌های گونه *آیزینیا فتیدا* معنی‌دار بوده است ( $p < 0.05$ ).

آلی با ارزش، خود نیز به‌خاطر دارا بودن درصد بالایی از پروتئین و ویتامین، منبع غذایی مهمی برای تغذیه طیور و آبزیان می‌باشند. در سال‌های اخیر در ایران، کرم‌های خاکی عمدتاً به‌منظور تولید ورمی‌کمپوست استفاده شده و برای این کار از کرم‌های *آیزینیا فتیدا* استفاده می‌شود. از این‌رو لازم است به تنوع در کرم‌های مورد استفاده در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست اهمیت داد و در انتخاب گونه‌های کرم‌های خاکی برای تولید کود، دقت لازم به‌عمل آید تا به مرور زمان مسائل و مشکلات جدیدی در اکوسیستم‌های طبیعی و زیستگاه‌های موجودات خاک ایجاد نشود. یحیی‌آبادی (۱۳۹۴)، در برخی نقاط استان اصفهان اقدام به شناسایی برخی گونه‌های کرم‌های اپی‌جیبیک نمود. در تحقیق فوق، گونه‌های *D. veneta* و *Eisenia fetida* در اکثر نقاط نمونه‌برداری بیش‌ترین جمعیت را داشتند. هدف مهم در این تحقیق نیز، مقایسه دو گونه از کرم‌های خاکی اپی‌جیبیک *Eisenia fetida* و *D. veneta* در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست با استفاده از دو نوع بستر متفاوت خواهد بود.

## مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال‌های ۹۴-۱۳۹۲ و در استان اصفهان به اجرا درآمد. به‌منظور شناسایی و انتخاب کرم‌های مورد نظر، اقدام به نمونه برداری به روش دستی از کرم‌های خاکی موجود در خاک‌های سطحی و لاشبرگ‌های باغات، فضاهای سبز شهری، محل تجمع کودهای حیوانی در مزارع، کنار رودخانه‌ها و برکه‌ها شد. کرم‌ها و بخشی از محیط بستر آن‌ها به گلخانه واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان منتقل گردیدند. از هر محل نمونه‌برداری تعداد بیست عدد کرم بالغ (حاوی کمر بند جنسی) به‌صورت تصادفی انتخاب و در مخلوط الکل و استون تثبیت شدند و با استفاده از باینوکولار، برخی از مشخصات مورفولوژیک آن‌ها ثبت گردید تا در شناسایی گونه کرم مورد استفاده قرار گیرد. به‌منظور مقایسه خصوصیات زیستی کرم‌های خاکی گونه *E. fetida* و گونه *D. veneta*، در این تحقیق از دو ماده آلی که عمدتاً در روستاها (کود گاوی) و شهرها (کمپوست زباله) به‌مقدار بیش‌تری وجود دارد، به‌عنوان بستر و ماده غذایی برای کرم‌ها استفاده شد. برخی از مشخصات شیمیایی این کودها (کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، pH و نسبت C/N) نیز قبل از قرارگیری در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست، اندازه‌گیری شدند و در پایان دوره آزمایش نیز مشخصات فوق در ورمی‌کمپوست حاصله تعیین شدند (جدول ۱). برای استفاده از این مواد به‌عنوان بستر و ماده غذایی کرم‌ها، ابتدا آن‌ها خشک و سپس به قطعات ریز تبدیل شدند. مواد فوق در گلدان‌های با حجم دو لیتر ریخته و رطوبت آن‌ها به‌میزان ۷۰-۶۰ درصد وزنی تنظیم شد.



جدول ۱: خصوصیات شیمیایی بسترهای مختلف در ابتدا و انتهای دوره آزمایش (انحراف معیار  $\pm$  میانگین)

خصوصیات	کود گاو			کمپوست زباله		
	انتهای دوره	انتهای دوره	ابتدای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	ابتدای دوره
	<i>D. veneta</i>	<i>E. fetida</i>	<i>D. veneta</i>	<i>E. fetida</i>	<i>D. veneta</i>	<i>E. fetida</i>
نیترژن کل %	۰/۸۸ $\pm$ ۰/۰۲	۱/۷۴ $\pm$ ۰/۰۲	۱/۷۲ $\pm$ ۰/۰۳	۰/۷۲ $\pm$ ۰/۰۷	۰/۹۱ $\pm$ ۰/۰۶	۰/۹۲ $\pm$ ۰/۰۶
فسفر کل %	۰/۶۳ $\pm$ ۰/۰۴	۰/۹۶ $\pm$ ۰/۰۳	۰/۹۴ $\pm$ ۰/۰۶	۰/۴۵ $\pm$ ۰/۰۴	۰/۸۲ $\pm$ ۰/۰۳	۰/۶۸ $\pm$ ۰/۰۷
پتاسیم %	۰/۷۲ $\pm$ ۰/۰۳	۰/۹۱ $\pm$ ۰/۰۱۲	۰/۹۷ $\pm$ ۰/۰۸	۰/۶۷ $\pm$ ۰/۰۶	۰/۸۱ $\pm$ ۰/۰۹	۰/۷۵ $\pm$ ۰/۰۹
کربن آلی %	۳۰/۵۴ $\pm$ ۰/۰۴	۲۶/۵۳ $\pm$ ۰/۰۶	۲۳/۰۳ $\pm$ ۰/۰۹	۳۸/۲۷ $\pm$ ۰/۲۲	۳۱/۲۳ $\pm$ ۰/۰۵	۳۱/۱۷ $\pm$ ۰/۱۲
مواد آلی %	۵۲/۶۵ $\pm$ ۰/۳۸	۴۵/۷۳ $\pm$ ۰/۳۳	۳۹/۸۷ $\pm$ ۰/۳۸	۶۵/۹۷ $\pm$ ۰/۴۲	۵۳/۷۴ $\pm$ ۰/۲۸	۵۳/۷۰ $\pm$ ۰/۲۷
C/N	۷۰/۳۴ $\pm$ ۰/۲۹	۱۵/۲۴ $\pm$ ۰/۲۱	۱۳/۳۸ $\pm$ ۰/۲۳	۴۶/۶۷ $\pm$ ۰/۱۹	۳۳/۵۸ $\pm$ ۰/۱۷	۳۲/۴۶ $\pm$ ۰/۱۶
pH	۸/۲۶ $\pm$ ۰/۰۷	۷/۸۲ $\pm$ ۰/۰۵	۷/۰۲ $\pm$ ۰/۰۴	۷/۹۱ $\pm$ ۰/۰۴	۷/۱۲ $\pm$ ۰/۰۳	۷/۴۵ $\pm$ ۰/۰۵

جدول ۲: مقایسه خصوصیات ورمی کمپوست تولید شده توسط دو گونه کرم با استفاده از آزمون T (انحراف معیار  $\pm$  میانگین)

خصوصیات	کود گاو			کمپوست زباله		
	<i>D. veneta</i>	<i>I. fetida</i>	آزمون T	<i>D. veneta</i>	<i>I. fetida</i>	آزمون T
نیترژن کل %	۱/۷۴ $\pm$ ۰/۰۲	۱/۷۲ $\pm$ ۰/۰۳	p= ۰/۱۸۴	۰/۹۱ $\pm$ ۰/۰۶	۰/۹۲ $\pm$ ۰/۰۶	p= ۰/۴۲۸
فسفر کل %	۰/۹۶ $\pm$ ۰/۰۳	۰/۹۴ $\pm$ ۰/۰۶	p= ۰/۰۸۶	۰/۸۱ $\pm$ ۰/۰۹	۰/۶۸ $\pm$ ۰/۰۷	p= ۰/۰۰۱
پتاسیم %	۰/۹۱ $\pm$ ۰/۰۱۲	۰/۹۷ $\pm$ ۰/۰۸	p= ۰/۰۴۳	۳۱/۲۳ $\pm$ ۰/۰۵	۳۱/۱۷ $\pm$ ۰/۱۲	p= ۰/۰۴۷
کربن آلی %	۲۶/۵۳ $\pm$ ۰/۰۶	۲۳/۰۳ $\pm$ ۰/۰۹	p= ۰/۰۲۶	۵۳/۷۴ $\pm$ ۰/۲۸	۵۳/۷۰ $\pm$ ۰/۲۷	p= ۰/۱۰۵
مواد آلی %	۴۵/۷۳ $\pm$ ۰/۳۳	۳۹/۸۷ $\pm$ ۰/۳۸	p= ۰/۰۲۵	۳۳/۵۸ $\pm$ ۰/۱۷	۳۲/۴۶ $\pm$ ۰/۱۶	p= ۰/۵۴۸
C/N	۱۵/۲۴ $\pm$ ۰/۲۱	۱۳/۳۸ $\pm$ ۰/۲۳	p= ۰/۰۲۱	۷/۱۲ $\pm$ ۰/۰۳	۷/۴۵ $\pm$ ۰/۰۵	p= ۰/۰۰۳
pH	۷/۸۲ $\pm$ ۰/۰۵	۷/۰۲ $\pm$ ۰/۰۴	p= ۰/۰۰۴			p= ۰/۰۰۱

گزارش شد. به همین ترتیب بیشترین نرخ رشد وزنی برای هر کرم در روز به عدد ۱۱/۲۳ میلی گرم رسید که نسبت به بستر کود گاو اندکی کاهش یافت. این میزان نرخ رشد در پایان روز ۱۳۵ به ۳/۰۲ تنزل کرده بود. میانگین بیشترین تعداد کرم در این بستر در روز ۹۰ و به تعداد ۵۸ مشاهده شد و سرانجام میانگین بیشترین تعداد کوکون‌های گونه *آیزنیا فتیدا* شمارش شده در بستر کمپوست زباله در روز ۱۰۵ مشاهده شد که بالغ بر ۲۹ عدد بود. در مقام مقایسه دو بستر، نتایج نشان می‌دهند که از نظر وزن زنده کرم، بستر کود گاو بهتر از کمپوست زباله عمل کرده است زیرا بیشترین وزن زنده گونه *آیزنیا فتیدا* در کود گاو مشاهده شد.

نتایج بررسی تغییرات رشد کرم خاکی گونه *D. veneta* در دو بستر مورد مطالعه، در جدول ۴ آمده است. گونه ساکن در کود گاو در روز ۱۰۵ به بیشترین وزن زنده خود رسید (۱۶/۲۲۴  $\pm$  ۲ میلی گرم) و پس از آن کاهش یافت. با این وجود، بیشترین نرخ رشد این گونه برای هر کرم در روز به ۹/۵۷  $\pm$  ۱/۰۹ میلی گرم رسید (صدوپنجمین روز). از طرفی میانگین تعداد کرم گونه *D. veneta* از ۲۰ در ابتدای شروع آزمایش به بیشترین تعداد خود (۵۱) در روز ۱۰۵ رسید اما در پایان دوره آزمایش تعداد آن‌ها به ۳۶ تنزل یافت. میانگین بیشترین

یکی دیگر از اهداف اجرای این تحقیق، بررسی تغییرات رشد دو گونه مورد نظر و تعیین خصوصیات زیستی آن‌ها بود. نتایج به دست آمده در جداول ۳ و ۴ نشان داده شده است. کرم‌های خاکی تلفیح شده به بستر، در طول زمان انجام تحقیق، نرخ رشد و تکثیر معنی‌داری از خود نشان دادند به نحوی که برای گونه *E. fetida* این افزایش نرخ رشد در نمونه برداری روز ۷۵ به حداکثر خود رسید اما برای گونه *D. veneta* در روز ۱۰۵ به بیشترین میزان رسید و پس از آن کاهش یافت. کرم‌های گونه *آیزنیا فتیدا* در بستر کود گاو، در روز ۷۵ به بیشترین وزن زنده خود رسیدند (۲۲/۱۱۲۵  $\pm$  ۵ میلی گرم) و در زمان‌های بعدی کاهش یافتند. با این حال بیشترین نرخ رشد برای هر کرم در روز، به ۱۲/۸۹ میلی گرم رسید (شصتمین روز). از طرفی میانگین تعداد کرم گونه *آیزنیا فتیدا* از ۲۰ در ابتدای شروع آزمایش به بیشترین تعداد خود (۵۳) در روز نودم رسید اما در پایان دوره آزمایش تعداد آن‌ها به ۴۳ رسید. میانگین بیشترین تعداد کوکون‌های شمارش شده در بستر در روز ۱۰۵ مشاهده شد که بالغ بر ۲۸ عدد بود. استفاده از بستر کمپوست زباله برای بررسی فاکتورهای رشد کرم *E. fetida* باعث تغییراتی در اندازه‌گیری‌های فوق گردید به نحوی که بیشترین وزن زنده کرم این گونه در روز ۹۰ به میزان ۱۲۱۴ میلی گرم

به بستر کود گاو کاهش یافت. این میزان نرخ رشد در آخرین اندازه گیری به ۵/۳۴ تنزل کرده بود. میانگین بیشترین تعداد کرم در این بستر در روز صدوبیستم و به تعداد ۵۴/۱۲ مشاهده شد و سرانجام میانگین بیشترین تعداد کوکون‌های گونه *دندروینا ونتا* شمارش شده در بستر کمپوست زباله در روز ۱۲۰ مشاهده شد که بالغ بر ۲۹ عدد بود.

تعداد کوکون‌های شمارش شده در بستر در روز ۱۰۵ مشاهده شد که بالغ بر ۲۸ عدد بود. استفاده از بستر کمپوست زباله برای بررسی فاکتورهای رشد کرم *D. veneta* باعث تفاوت‌هایی در صفات زیستی گردید به نحوی که بیشترین وزن زنده کرم این گونه، در روز ۱۲۰ به میزان ۱۲۳۵ میلی‌گرم گزارش شد. به همین ترتیب بیشترین نرخ رشد وزنی برای هر کرم در روز به عدد ۸/۵۴ میلی‌گرم رسید که نسبت

جدول ۳: تغییرات رشد کرم *E. fetida* در بسترهای مختلف (انحراف معیار  $\pm$  میانگین)

روز	کود گاو			کمپوست زباله		
وزن زنده کرم میلی‌گرم	نرخ رشد روز/کرم/میلی‌گرم	میانگین تعداد کرم‌ها	میانگین	وزن زنده میلی‌گرم	نرخ رشد روز/کرم/میلی‌گرم	میانگین تعداد کوکون
۰	۰	۲۰/۰±۰۰/۰۴	۰	۰±۲۱۰/۰۵	۰	۲۰/۰±۰۰/۰۲
۱۵	۶/۰±۸۵/۱۱	۱۸/۰±۳۴/۰۴	۰/۰±۳۴/۱۴	۰±۲۹۵/۰۷	۵/۰±۷۲/۰۴	۰/۰±۰۹/۰۵
۳۰	۷/۰±۰۴/۱۱	۱۸/۰±۲۲/۰۶	۶/۰±۱۲/۰۸	۱±۳۸۲/۲۳	۵/۰±۶۹/۰۷	۶/۰±۲۳/۰۶
۴۵	۱۱/۰±۲۱/۰۸	۲۴/۱±۴۵/۲۴	۹/۱±۲۲/۰۲	۲±۵۶۵/۹۷	۸/۱±۰۲/۲۳	۸/۰±۰۰/۰۵
۶۰	۱۲/۰±۸۹/۱۲	۳۲/۱±۱۶/۰۷	۱۶/۱±۰۵/۰۹	۲±۸۲۳/۸۴	۱۰/۰±۳۰/۱۲	۱۹/۱±۶۴/۲۱
۷۵	۱۲/۰±۴۶/۱۴	۴۷/۲±۵۶/۰۹	۲۱/۱±۰۰/۰۸	۵±۱۰۰۹/۰۱	۱۰/۰±۴۵/۱۴	۲۴/۱±۰۲/۳۲
۹۰	۸/۰±۵۳/۰۹	۵۳/۲±۱۲/۰۱	۲۵/۰±۲۱/۹۴	۴±۱۲۱۴/۲۲	۱۱/۱±۲۳/۶۰	۲۸/۲±۳۳/۴۸
۱۰۵	۶/۱±۲۴/۲۱	۵۰/۱±۸۴/۶۷	۲۸/۲±۰۰/۲۱	۴±۱۰۰۳/۰۶	۷/۰±۶۹/۰۸	۲۹/۱±۱۹/۶۲
۱۲۰	۵/۰±۰۹/۰۸	۴۶/۰±۲۶/۱۴	۲۲/۱±۲۵/۴۸	۳±۷۸۵/۷۲	۴/۱±۷۸/۰۱	۱۸/۱±۰۸/۰۱
۱۳۵	۴/۱±۰۶/۰۶	۴۳/۱±۱۲/۰۷	۱۷/۰±۶۹/۶۴	۲±۶۰۵/۸۸	۳/۰±۰۲/۰۹	۱۴/۱±۸۹/۰۲

جدول ۴: تغییرات رشد کرم *D. veneta* در بسترهای مختلف (انحراف معیار  $\pm$  میانگین)

روز	کود گاو			کمپوست زباله		
وزن زنده میلی‌گرم	نرخ رشد روز/کرم/میلی‌گرم	میانگین تعداد کرم‌ها	میانگین	وزن زنده میلی‌گرم	نرخ رشد روز/کرم/میلی‌گرم	میانگین تعداد کوکون
۰	۰	۲۰/۰±۰۰/۰۷	۰	۰±۲۱۲/۰۴	۰	۲۰/۰±۰۰/۰۱
۱۵	۷/۰±۰۸/۱۳	۱۹/۰±۰۶/۱۲	۰/۰±۲۱/۰۶	۰±۲۸۶/۱۰	۵/۰±۲۳/۲۴	۰/۰±۰۸/۰۱
۳۰	۶/۰±۲۳/۱۱	۱۹/۰±۴۵/۰۸	۵/۰±۲۴/۲۷	۱±۳۷۶/۳۰	۵/۰±۵۶/۰۹	۴/۰±۶۱/۰۵
۴۵	۸/۱±۱۹/۲۲	۲۱/۱±۸۹/۶۱	۴/۰±۸۶/۰۵	۱±۴۹۸/۰۸	۶/۱±۳۱/۰۴	۴/۰±۵۳/۱۱
۶۰	۸/۰±۴۶/۰۸	۲۷/۱±۰۳/۰۵	۷/۱±۷۷/۰۱	۲±۷۲۴/۴۸	۸/۰±۴۹/۰۶	۶/۰±۳۸/۰۸
۷۵	۸/۰±۹۴/۲۶	۳۲/۰±۵۸/۰۶	۱۱/۱±۳۱/۱۶	۱±۸۲۰/۳۲	۸/۲±۱۲/۳۰	۹/۲±۱۲/۱۲
۹۰	۸/۲±۱/۴۱	۴۱/۰±۱۱/۲۲	۱۵/۳±۲۱/۴۲	۰±۸۹۲/۵۶	۷/۱±۵۲/۲۱	۱۲/۱±۸۹/۱۸
۱۰۵	۹/۱±۵۷/۰۹	۵۱/۲±۳۱/۰۶	۲۸/۰±۰۸/۲۳	۴±۹۸۴/۸۸	۷/۰±۳۲/۴۲	۲۱/۲±۷۸/۲۵
۱۲۰	۸/۱±۲/۵۷	۴۷/۱±۴۹/۶۰	۲۱/۲±۰۰/۰۶	۲±۱۲۳۵/۳۲	۸/۰±۵۴/۰۵	۲۹/۰±۰۶/۶۴
۱۳۵	۵/۰±۱۶/۰۵	۳۶/۰±۲۲/۱۴	۱۶/۲±۴۸/۱۴	۰±۹۳۶/۱۶	۵/۰±۳۴/۱۸	۱۹/۰±۶۲/۶۸

از تعداد کوکون گونه *دندروینا ونتا* (۱۱۱/۱۶) می‌باشد. این اختلاف، بسیار معنی‌دار ( $p=۰/۰۰۲$ ) است و نشان می‌دهد که تفریق کرم‌های نوزاد از کوکون‌ها در گونه *دندروینا ونتا* موفق‌تر بوده است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند که میانگین تعداد کوکون به‌ازای هر کرم در گونه *آیزنیا فتیدا* بیش از گونه رقیب بوده است.

مقایسه برخی از مهم‌ترین صفات زیستی تکثیر دو گونه کرم خاکی با استفاده از آزمون جفت شده T، در جدول ۵ نمایش داده شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند در بستر کود گاو، اختلاف آماری معنی‌داری در میانگین بیشترین تعداد کرم در دو گونه، وجود ندارد با این حال، میانگین تعداد کوکون گونه *آیزنیا فتیدا* (۱۴۵/۸۸) بیش



میانگین تعداد کوکون برای هر کرم و میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز، معنی دار است ( $p \leq 0/05$ ) و گونه *E. fetida* عملکرد بهتری از خود نشان داده است، با این حال دو گونه از نظر میانگین بیشترین تعداد کرم، اختلاف معنی داری ندارند ( $p=0/146$ ).

همچنین در بستر کود گاو، اختلاف دو گونه کرم خاکی از نظر میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز نیز معنی دار است. مقایسه صفات زیستی دو گونه کرم خاکی در بستر کمپوست زباله نشان می دهد با وجودی که اختلاف دو گونه از نظر میانگین کلی تعداد کوکون،

جدول ۵: مقایسه خصوصیات تکثیر دو گونه کرم با استفاده از آزمون T (انحراف معیار  $\pm$  میانگین)

کمپوست زباله			کود گاو			خصوصیات زیستی
آزمون T	<i>D. veneta</i>	<i>E. fetida</i>	آزمون T	<i>D. veneta</i>	<i>E. fetida</i>	
$p=0/146$	$54/1 \pm 12/10$	$58/1 \pm 14/48$	$p=0/686$	$51/2 \pm 31/06$	$53/2 \pm 12/01$	میانگین بیشترین تعداد کرمها
$p=0/011$	$108/4 \pm 07/12$	$154/3 \pm 47/88$	$p=0/002$	$111/4 \pm 16/52$	$145/3 \pm 88/24$	میانگین جمع کوکونها
$p=0/035$	$5/0 \pm 36/06$	$7/0 \pm 75/08$	$p=0/022$	$5/0 \pm 46/08$	$7/1 \pm 35/25$	میانگین تعداد کوکون (تعداد/کرم)
$p=0/018$	$0/0 \pm 81/02$	$1/0 \pm 16/04$	$p=0/012$	$0/0 \pm 81/02$	$1/0 \pm 09/02$	میانگین تعداد کوکون (تعداد/کرم/روز)

می شوند. همچنین عقیده بر این است که کرمها، سطح نیتروژن را در ورمی کمپوست، با ترشح مایعات دفعی، موکوس، آنزیمها و حتی از طریق تجزیه بافت مرده کرمهای خاکی در بستر، افزایش می دهند (Suthar, 2007). بخشی از نتایج تحقیق نشان داد که فسفر کل در محصول نهایی ورمی کمپوست در هر دو بستر افزایش داشته است، این افزایش در کود گاو  $52/3$  درصد توسط *E. fetida* و  $49/2$  درصد توسط *D. veneta* اتفاق افتاده است. در بستر کمپوست زباله، افزایش فسفر کل به میزان  $51/1$  درصد از فعالیت کرم *E. fetida* حاصل شده است و به مقدار  $82/2$ ٪ ناشی از بازیافت مواد توسط کرم *D. veneta* بوده است و این نشان می دهد که اختلاف فعالیت دو گونه کرم خاکی در افزایش فسفر در ورمی کمپوست کود گاو از نظر آماری معنی دار نبوده اما در ورمی کمپوست زباله شهری معنی دار بوده و از این رو گونه *آیزنیا فتیدا* عملکرد بهتری از خود نشان داده است (جدول ۲).

افزایش سطح فسفر در ورمی کمپوست تولیدشده را نیز به معنی شدن فسفر آلی در این فرآیند ربط می دهند. Lee (1992)، پیشنهاد کرد که عبور مواد آلی از دستگاه گوارش کرم خاکی موجب می شود تا فسفر به شکل قابل جذب گیاه تبدیل شود. فسفر آزاد شده به شکل فسفر قابل جذب، تا حدی به خاطر وجود آنزیم فسفاتاز در دستگاه گوارش کرم و بخشی نیز ممکن است به دلیل حضور میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات در مواد دفعی کرمها باشد. Binet و Le Bayon (2006)، نتیجه گرفتند که این تأثیر کرمهای خاکی بر تبدیل و تغییرات بیوشیمیایی فسفر در خاک، بستگی به ارتباط نزدیک بین خصوصیات منبع فسفر آلی و نوع حرکت کرم در خاک دارد. میزان پتاسیم نیز در فرآیند تبدیل مواد به ورمی کمپوست، افزایش داشته است. این افزایش پتاسیم در ورمی کمپوست کود گاو برای کرمهای گونه *E. fetida* و *D. veneta* به ترتیب برابر  $26/4$  و  $34/7$  درصد مشاهده شد درحالی که این افزایش در ورمی کمپوست زباله برای

## بحث

بر اساس آزمون T، دو گونه کرم مورد آزمایش، در کاهش pH بستر کود گاو و کمپوست زباله اختلاف معنی دار داشته اند ( $p < 0/05$ ) به نحوی که گونه *D. veneta* توانایی بیشتری در کاهش pH بسترها داشته است (جدول ۲). این تغییر pH عمدتاً به دلیل تولید دی اکسید کربن و اسیدهای آلی در زمان تجزیه است (Huhta و Haimi, 1986). با این حال، نتایج تحقیق Ndegwa و همکاران (2000) نشان داد که کاهش pH بر اثر معدنی شدن نیتروژن و ارتو فسفاتها و تبدیلات زیستی مواد آلی رخ داده است. بنابراین تفاوت در pH ورمی کمپوست حاصله از دو گونه کرم خاکی مورد آزمایش می تواند بر اثر تفاوت کارایی معدنی کردن عناصر در دو گونه کرم باشد. کربن آلی نیز در این فرآیند کاهش یافته به طوری که در ورمی کمپوست کود گاو، این کاهش به  $24/6$  درصد برای گونه *D. veneta* و  $13/1$  درصد برای گونه *E. fetida* رسیده و در ورمی کمپوست زباله به حدود  $18/5$ ٪ برای هر دو گونه به دست آمد. هدررفت کربن آلی در طول زمان فرآیند تولید ورمی کمپوست، عمدتاً بر اثر تنفس میکروبی و خروج  $CO_2$  و یا بر اثر معدنی شدن مواد آلی رخ می دهد (Garg و Kaushik, 2005). از طرفی، نیتروژن کل از ابتدا تا انتهای آزمایش افزایش یافته است. میزان افزایش نیتروژن در کود گاو به  $97/7$  و  $95/4$  درصد به ترتیب برای گونه *E. fetida* و گونه *D. veneta* بوده و این افزایش در کمپوست زباله به  $27/7$  و  $26/4$ ٪ به ترتیب برای گونه *E. fetida* و گونه *D. veneta* محاسبه شد. نتایج آزمون T بیانگر آن است که اختلاف در افزایش نیتروژن در هر دو بستر توسط دو گونه کرم معنی دار نبوده است ( $p < 0/05$ ). افزایش نیتروژن در ورمی کمپوست تولید شده نسبت به مواد اولیه، به این دلیل اتفاق می افتد که کرمهای خاکی موجب تسهیل در معدنی شدن نیتروژن مواد زائد شهری و کشاورزی

رشد تغییرات وزن زنده و تعداد کرم‌های دو گونه کرم خاکی در بستر کود کمپوست در شکل ۱ و روند تغییرات در بستر کود گاو در شکل ۲ نشان داده شده است. در بستر کمپوست، تعداد کرم‌های گونه *E. fetida* در روز ۹۰ به حداکثر خود رسید اما کرم‌های گونه *D. veneta* در روز ۱۲۰ به بیش‌ترین تعداد رسیدند. در بستر کود گاو نیز (شکل ۵)، تعداد کرم‌های گونه *E. fetida* در روز ۹۰ به حداکثر خود رسید اما کرم‌های گونه *D. veneta* در روز ۱۰۵ به بیش‌ترین تعداد رسیدند این نتایج نشان می‌دهد که کرم‌های گونه *E. fetida* سرعت رشد بیش‌تری دارند و چرخه تکثیر آن‌ها کوتاه‌تر است. کاهش وزن زنده و تعداد کرم‌ها در بستر پس از این زمان، امری طبیعی و ناشی از کم شدن مواد غذایی قابل استفاده در بستر آن‌هاست.

کرم‌های گونه *E. fetida* و *D. veneta* به ترتیب برابر ۱۲/۹ و ۲۰/۹ درصد بوده است. با وجود افزایش در میزان پتاسیم، عملکرد دو گونه کرم در این خصوص در هر دو بستر مشابه بوده و اختلاف معنی‌دار نداشته‌اند ( $p < 0.05$ ). برخی مطالعات دیگر نیز به افزایش سطح پتاسیم در ورمی کمپوست اشاره می‌کنند (Manna و همکاران، ۲۰۰۳). نسبت C/N مواد اولیه می‌تواند میزان معدنی شدن و تثبیت مواد آلی را در طول فرآیند تولید ورمی کمپوست نشان دهد. هدررفت کربن به شکل CO<sub>2</sub> از طریق تنفس میکروبی و هم‌زمان افزودن نیتروژن توسط کرم‌ها به شکل موکوس و ترشحات نیتروژنی، موجب کاهش نسبت C/N در محصول نهایی شده‌اند (Suthar، ۲۰۰۷).



شکل ۱: نمودار تغییرات وزن زنده و تعداد کرم‌های دو گونه در بستر کود کمپوست

تولیدکننده ورمی کمپوست، به دلیل آشنا نبودن به گونه‌های کرم خاکی ایبی‌جییک، فقط تمایل زیادی به استفاده از کرم‌های *E. fetida* دارند و گاهی دیده می‌شود که برخی حتی مبادرت به واردات این کرم‌ها از خارج از کشور کرده و هزینه زیادی نیز متحمل می‌شوند. از سویی دیگر، اقدام به تکثیر فقط یک گونه کرم خاکی و عدم توجه به سایر گونه‌ها، موجب خواهد شد که تنوع زیستی کرم‌های خاکی در خاک‌های کشور کاهش یابد و گونه وارداتی ممکن است در آینده به یک گونه مهاجم تبدیل شود، بنابراین می‌توان اقدام به تکثیر از کرم‌های گونه *D. veneta* که تفاوت زیادی نیز از نظر خصوصیات زیستی با گونه *E. fetida* ندارد، کرد و از این کرم‌ها نیز در تولید ورمی کمپوست استفاده نمود. این مهم، با ترویج هرچه بیشتر اطلاعات و آگاهی‌ها در خصوص کرم‌های خاکی گونه‌های مختلف به انجام خواهد رسید.

Neuhauser و همکاران (۱۹۸۸) نیز روند مشابهی برای کاهش وزن کرم‌ها در بستر لجن فاضلاب مشاهده کردند. Edwards و همکاران (۱۹۹۸)، الگوی رشد گونه *P. excavatus* در بستر کود گاوی را بررسی کردند و نرخ رشد این گونه را بین ۱/۶ تا ۷/۶ اعلام کردند. اختلاف نتایج محققین در مورد بیش‌ترین وزن کرم‌ها و یا نرخ رشد آن‌ها ممکن است در اثر تفاوت در کیفیت مواد اولیه بستر و یا شرایط متغیر محیطی باشد. به همین ترتیب می‌توان تفاوت نرخ رشد دو گونه *E. fetida* و *D. veneta* را به الگوی رشد ویژه هر گونه و یا سلیقه تغذیه‌ای کرم‌های خاکی هر دو گونه نسبت داد. هم‌چنین تغییر صفات اندازه‌گیری شده گونه‌ها در بسترهای کمپوست زباله و کود گاو، می‌تواند به دلیل تفاوت طبیعی و شیمیایی مواد موجود در این بسترها باشد. در مجموع نتایج نشان داد کرم‌های خاکی گونه *D. veneta* شباهت زیستی زیادی با گونه *E. fetida* دارند با این حال، اکثر تولید کنندگان ورمی کمپوست و یا فروشندگان کرم‌های





شکل ۲: نمودار تغییرات وزن زنده و تعداد کرم‌های دو گونه در بستر کود گاو

## تشکر و قدردانی

از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور به لحاظ فراهم نمودن اعتبار پژوهشی این تحقیق و از همکاری آقایان دکتر تدرین نژاد و دکتر دهقانی در اجرای این تحقیق، تشکر کرده و هم‌چنین از همکاری و مساعدت مسولین و کارکنان آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در فراهم آوردن امکانات و شرایط این تحقیق سپاسگزاری می‌شود. از داوران محترم مقاله نیز به خاطر قبول زحمت داوری و ارائه پیشنهادات مفید، قدردانی می‌گردد.

## منابع

- Bowman, H., 1992. A defined medium for the study of growth and reproduction of earthworm *Eisenia fetida*. J. Biol. Fert. Soils. Vol. 10, No. 4, pp: 285-289.
- Carica, C.; Ceccanti, B. and Masciandro, G., 1995. Phosphatase and beta glucosidase in humic substances from animal waste. Bio. Technology, Vol. 53, No. 1, pp: 79-87.
- Edwards, C.A.; Dominguez, J. and Neuhauser, E.F., 1998. Growth and reproduction of *Perionyx excavatus* (Perr.) (Megascolecidae) as factors in organic waste management. Biol. Fert. Soils. Vol. 27, pp: 155-161.
- Edwards, C.A. and Bohlen, J.P., 1996. Biology and Ecology of earthworms. Chapman & Hall, London. 436 p.
- Edwards, C.A. and Neuhauser, E.F., 1988. Earthworms in waste and environmental management. Academic publishing, Nether Lands. 391 P.
- Garg, V.K. and Kaushik, P., 2005. Vermistabilization of textile mill sludge spiked with poultry droppings by epigeic earthworm *Eisenia fetida*. Bioresource Tech. Vol. 96, pp: 1063-1071.
- Hale, C.M.; Frelich, L.E. and Reich, P.B., 2000. Impact of invading European earthworms on understory plant communities in previously worm-free hard wood forest of Minnesota. Abstract of the Ecological Society of America. Vol. 85, pp: 112.
- Haimi, J. and Huhta, V., 1986. Capacity of various organic residues to support adequate earthworm biomass for vermicomposting. Biol. Fert. Soils. Vol. 2, pp: 23-27.
- Lee, K.E., 1992. Some trends opportunities in earthworm research or: Darwin's children. The future of our discipline. Soil Biol. Biochem. Vol. 24, pp: 1765-1771.
- Lee, K.E., 1985. Earthworms. Their Ecology and relationships with soils and Land use. Academic press, Sydney. 411 P.
- Le Bayon, R.C. and Binet, F., 2006. Earthworm changes the distribution and availability of phosphorous in organic substrates. Soil Biol. Biochem. Vol. 38, pp: 235-246.
- Loh, T.C.; Lee, Y.C.; Liang, J.B. and Tan, D., 2005. Vermicomposting of cattle and goat manures by *Eisenia foetida* and their growth and reproduction preference. Biores. Tech. Vol. 96, No. 1, pp: 111-114.
- Mackey, D. and Kladrivko, E.J., 1985. Earthworms and rate of breakdown of soybean and maize residues in soil. Soil Biology and Biochemistry. Vol. 17, No. 6, pp: 851-857.
- Manna, M.C.; Jha, S.; Ghosh, P.K. and Acharya, C.L., 2003. Comparative efficiency of three epigeic earthworms under different deciduous forest litter decomposition. Bioresource Tech. Vol. 88, pp: 197-206.
- Ndegwa, P.M.; Thompson, S.A. and Das, K.C., 2000. Effects of stocking density and feeding rate on vermicomposting of biosolids. Bioresource Tech. Vol. 71, No. 1, pp: 5-12.
- Neuhauser, E.F.; Loehr, R.C. and Makecki, M.R., 1988. The potential of earthworms for managing sewage sludge. In: Edwards, C.A., Neuhauser, E.F., Earthworm in waste and environmental management. SPB Academic Publishing, pp: 9-20.
- Suthar, S., 2007. Vermicomposting potential of *Perionyx sansibaricus* (Perrier) in different waste materials. Bioresource Tech. Vol. 98, No. 6, pp: 1231-1237.
- هاشمی مجد، ک.، ۱۳۸۲. شناسایی گونه *Eisenia fetida* برخی از مناطق شمالی ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال ۷، شماره ۴، صفحات ۶۱ تا ۷۰.
- یحیی آبادی، م.، ۱۳۹۱. کرم‌ها زباله‌هایم را می‌خورند. نشر نصح. ۱۷۵ صفحه.
- یحیی آبادی، م.، ۱۳۹۴. بررسی تنوع کرم‌های خاکی ایبی جنیک در استان اصفهان. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره ۹، شماره ۱، صفحات ۱۳۳ تا ۱۴۲.
- Aira, M.; Monroy, F.; Dominguez, J. and Mato, S., 2002. How earthworm density affects microbial biomass and activity in pig manure. Eur. J. Soil Biol. Vol. 38, pp: 7-10.
- Baker, G. and Kilpin, G., 1992. CSIRO Double Helix Science club, Earthworm Identifier. CSIRO Publication, East Melbourne, 210 p.
- Benitez, E.; Nogales, R.; Masciandro, G. and Ceccanti, B., 2000. Isolation by isoelectric focusing of humic-urease complexes from earthworm (*Eisenia fetida*) processed sewage sludges. Biol. Fert. Soils. Vol. 31, pp: 489-493.
- Birundha, M.; John, J.; Paul, A. and Mariappan, P., 2013. Growth and reproduction of *Perionyx excavatus* in different organic wastes. Int.J.Cur.Microbio.Ap.Sci. Vol. 2, pp: 28-35.