

## بررسی چندشکلی آللی ژن‌های PIT۱ و STAT۵B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

- **حسین عطارچی\***: گروه علوم دامی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: ۶۴۹۵۵
- **مجتبی طهمورث‌پور**: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: ۹۱۷۷۵
- **مجتبی آهنی‌آذری**: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹
- **محمدهادی سخاوتی**: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: ۹۱۷۷۵
- **مختار مهاجر**: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، صندوق پستی: ۸۵۷۹۹

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۹۵ تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۹۵

### چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن‌های PIT۱ و STAT۵B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران انجام شد. برای این منظور، تعداد ۲۰۰ قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ‌های بومی مازندران در شرایط یکسان پرورش داده شده و همگی در سن ۱۲ هفتگی کشتار شدند. صفات مورد بررسی قبل و بعد از کشتار شامل وزن زنده در ۴، ۸ و ۱۲ هفتگی، وزن لاشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال، چربی حفره شکمی، pH گوشت، ظرفیت نگهداری آب گوشت و چربی داخل عضله‌ای اندازه‌گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه‌های مورد نظر هر یک از ژن‌ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن‌ها تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP با آنزیم‌های اختصاصی آن‌ها انجام گرفت. فراوانی هر یک از آلل‌های (+) و (-) در جایگاه ژنی PIT۱ به ترتیب برابر با ۰/۷۱۵ و ۰/۲۸۵ و در جایگاه ژنی STAT۵B به ترتیب برابر با ۰/۳۵۵ و ۰/۶۴۵ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS ۹.۱۲ نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های ژن PIT۱ با صفات وزن زنده در ۱۲ هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد و ژنوتیپ‌های ژن STAT۵B با صفات وزن زنده در ۸ هفتگی و چربی حفره شکمی وجود دارد ( $p < 0/05$ ). براساس نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ژن‌های PIT۱ و STAT۵B می‌توانند در جایگاه مورد نظر به‌عنوان کاندید برای صفات رشد و لاشه در برنامه‌های اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.

**کلمات کلیدی:** STAT۵B، PIT۱، چندشکلی، صفات اقتصادی، مرغ بومی



## مقدمه

که این ژن به‌عنوان یک ژن کاندیدا نقش کلیدی در صفات مرتبط با رشد و تولیدمثل در طیور دارد (Ou و همکاران، ۲۰۰۹). اگرچه روش انتخاب مرسوم براساس ارزش‌های فنوتیپی طیور به‌طور قابل توجهی سرعت رشد و تولید گوشت را در چند دهه گذشته افزایش داده است ولی به‌دلیل آن‌که انتخاب فنوتیپ برتر همواره به معنای انتخاب ژنوتیپ برتر نیست و بسته به میزان دخالت واریانس محیطی در واریانس فنوتیپی، اختلاف بین فنوتیپ و ژنوتیپ وجود خواهد داشت، دقت انتخاب کاهش می‌یابد (Bai و همکاران، ۲۰۰۶). از سوی دیگر انتخاب براساس ارزش‌های فنوتیپی برای صفات کیفیت گوشت قبل از کشتار امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا امروزه انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی برای افزایش بازده انتخاب و بهبود عملکرد تولیدی مدنظر می‌باشد و تلفیقی از روش‌های مرسوم انتخاب و روش‌های جدید مولکولی در آینده اصلاح نژاد طیور ترجیح داده خواهد شد (Emara و Kim، ۲۰۰۳). نشانگر RFLP با توجه به تکرارپذیری و دقت بالای آن قادر به تشخیص چندشکلی در هر جایگاهی از ژنوم می‌باشد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸). هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چندشکلی موجود در جایگاه‌های مورد بررسی ژن‌های PIT۱ و STAT5B، برآورد میزان فراوانی آللی و ژنوتیپی آن‌ها و بررسی رابطه بین چندشکلی این الگوهای ژنوتیپی با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP می‌باشد.

## مواد و روش‌ها

در این پژوهش که در سال ۱۳۹۴ انجام شد با استفاده از روش ارزیابی کلوآک تعداد ۲۰۰ قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ‌های بومی مازندران انتخاب شدند. تمامی جوجه‌ها در شرایط یکسان پرورش داده شده و همگی در سن ۱۲ هفتگی کشتار شدند. برای اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه، با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۱ وزن زنده پرندگان در سن‌های ۸،۴ و ۱۲ هفتگی اندازه‌گیری شد و پس از کشتار وزن لاشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال و چربی حفره شکمی اندازه‌گیری شد. نمونه‌های گوشت عضله سینه آن‌ها به مدت ۱۰ روز در فریزر با دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد و بعد از انجمادزدایی در دمای محیط، صفات مربوط به کیفیت لاشه شامل pH، ظرفیت نگهداری آب و چربی داخل عضله‌ای اندازه‌گیری و ثبت گردید. برای تعیین pH گوشت از دستگاه pH متر بافتی استفاده شد. ظرفیت نگهداری آب با اندازه‌گیری وزن نمونه گوشت قبل و بعد

مرغان بومی به‌دلیل مقاومت به شرایط نامناسب محیطی و بیماری‌ها یکی از مهم‌ترین ذخایر ژنتیکی هر کشور محسوب می‌شوند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خزانه ژنتیکی مرغان بومی هنوز پایه و اساس اصلاح نژاد در بخش طیور را تشکیل می‌دهند. البته اطلاعات اندکی در رابطه با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های تولید و تولیدمثلی مرغان بومی وجود دارد (Ghazikhanishad و همکاران، ۲۰۰۷). مرغان بومی ایران ذخائر ژنتیکی پایه برای برنامه‌های اصلاح نژاد در زیستگاه‌های خویش محسوب می‌شوند، بنابراین شناخت دقیق این ذخائر ژنتیکی می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای برنامه‌های اصلاح نژادی در آینده و نتیجه‌دهی آن‌ها در زمان کوتاه‌تر و استفاده بهینه از منابع موجود در جهت افزایش تولید گردد (دهقان‌زاده و همکاران، ۱۳۸۳). صفات مهم اقتصادی توسط تعداد زیادی ژن که اثر برخی از آن‌ها زیاد و اثر برخی دیگر کم می‌باشد کنترل می‌شوند. مدل ژن عمده پیشنهاد می‌کند تعداد کمی ژن می‌تواند سهم عمده‌ای از تنوع ژنتیکی را به خود اختصاص دهد. پیشرفت‌های اخیر در ژنتیک مولکولی امکان شناسایی و تعیین توالی این ژن‌ها را فراهم نموده است. هم‌چنین پیشرفت‌های ژنتیکی در طول دهه‌های اخیر، بهبود قابل توجهی را در عملکرد طیور ایجاد نموده است (Havenstein و همکاران، ۲۰۰۳). براساس یافته‌های توالی‌یابی، ژن PIT۱ روی کروموزوم شماره ۱ مرغ قرار گرفته است و ۱۳۴۱۶bp طول دارد (Hillier و همکاران، ۲۰۱۳). این ژن در واقع یک فاکتور ویژه نسخه‌برداری هیپوفیزی می‌باشد که باعث تظاهر مناسب ژن‌های هورمون پرولاکتین و هورمون رشد در هیپوفیز قدامی می‌شود (Zwierzchowski و همکاران، ۲۰۰۱). در تحقیقاتی که روی این ژن انجام گرفته، ثابت شده است که این ژن به‌عنوان یک ژن کاندیدا نقش کلیدی در صفات تولیدی و عملکردی دارد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که تنوع این ژن در ارتباط با رشد، صفات لاشه و چربی است (Song و همکاران، ۲۰۰۵). براساس یافته‌های توالی‌یابی، ژن STAT5B روی کروموزوم شماره ۲۷ مرغ قرار گرفته است و ۱۱۴۴۴ bp طول دارد (Hillier و همکاران، ۲۰۱۳). ژن STAT5B متعلق به خانواده فاکتورهای رونویسی است که اثرات زیستی هورمون رشد را واسطه‌گری می‌کند (Robinson و Hennighausen، ۲۰۰۸). این ژن واسطه‌فعال شدن رونویسی و بیان ژن‌های هدف هورمون رشد به‌خصوص در کبد مثل IGF-۱ و IGF-۳ می‌باشد (Woelfle و Rotwein، ۲۰۰۴). در تحقیقاتی که روی این ژن انجام گرفته، ثابت شده است




قطعه مورد نظر با استفاده از یک مرحله ابتدایی واسرشته‌سازی در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰۰ ثانیه و ۳۵ چرخه شامل واسرشته‌سازی در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، دمای اتصال آغازگرها ۵۸ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه، دمای تکثیر ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵۰ ثانیه و یک دمای تکثیر نهایی ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰۰ ثانیه انجام شد. عمل هضم آنزیمی با حجم ۱۲ میکرولیتر برای ژن‌های PIT۱ و STAT5B به ترتیب از راست به چپ با استفاده از آنزیم برشی TaqI و MspI در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و برای ۱۶ ساعت بر روی محصول PCR انجام شد. برای مشاهده قطعات هضم شده و تعیین ژنوتیپ از الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۲ درصد و رنگ آمیزی ژل با Safe Stain استفاده شد. برای محاسبه فراوانی آلل‌ها، ژنوتیپ‌ها و آزمون کای مربع از نرم‌افزار Popgene۳۲ استفاده گردید. داده‌های به دست آمده با استفاده از مدل آماری زیر در نرم‌افزار آماری SAS۹.۱۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

$$y_{ijk} = M + G_i + d_j + e_{ijk}$$

که در این مدل  $y_{ijk}$ : بردار مشاهدات مربوط به صفات رشد و لاشه،  $M$ : اثر میانگین،  $G_i$ : اثر ثابت ژنوتیپ،  $d_j$ : اثر ثابت روز رکوردگیری و  $e_{ijk}$ : اثرات باقی‌مانده می‌باشد. آنالیز واریانس با رویه GLM و مقایسه بین میانگین‌های حداقل مربعات با آزمون توکی-کرامر انجام شد.

## نتیجه

اندازه قطعات تکثیر شده بعد از انجام واکنش PCR برای دو ژن PIT۱ و STAT5B به ترتیب برابر ۵۹۹ و ۵۵۴ جفت باز بوده است. در اثر برش آنزیم‌های هضمی، قطعات ۵۹۹، ۴۶۷ و ۱۳۲ جفت بازی برای ژن PIT۱ و قطعات ۵۵۴، ۴۷۷ و ۷۷ جفت بازی برای ژن STAT5B ایجاد شد (اشکال ۱ و ۲).



شکل ۱: الگوهای RFLP حاصل از برش با آنزیم TaqI برای ژن PIT۱  
M: نشانگر مولکولی ۱۰۰ جفت بازی. +/+، +/- و -/-: ژنوتیپ‌ها


از سانتی‌فیوژ به مدت ۴ دقیقه با سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه و سپس قرار دادن آن در آون به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و مجدد وزن‌کشی آن، با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

$$WHC(\%) = \frac{(WAC - WAO)}{WBC} \times 100$$

در این فرمول، WHC: ظرفیت نگهداری آب، WAC: وزن نمونه بعد از سانتی‌فیوژ، WAO: وزن نمونه بعد از آون و WBC: وزن نمونه قبل از سانتی‌فیوژ می‌باشد. اندازه‌گیری چربی داخل عضله‌ای با استفاده از روش سوکسله در آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. قبل از کشتار، از تمام پرندگان به مقدار ۲ میلی‌لیتر خون از ورید زیر بال، در تیوب‌های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA گرفته و نمونه‌های خون اخذ شده تا زمان استخراج DNA در فریزر در دمای  $-20^{\circ}\text{C}$  در آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگهداری گردید. استخراج DNA از نمونه‌های خون با استفاده از کیت شرکت سیناژن و براساس دستور کار شرکت سازنده انجام شد. برای تعیین کمیت و کیفیت نمونه‌های DNA استخراج شده از دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی ژل آگارز استفاده گردید. به منظور تکثیر یک قطعه ۵۹۹ جفت بازی از ناحیه اینترون ۵ ژن PIT۱ از آغازگرهای استفاده شده توسط Nie و همکاران (۲۰۰۸) و به منظور تکثیر یک قطعه ۵۵۴ جفت بازی از ناحیه پروموتور ژن STAT5B از آغازگرهای استفاده شده توسط Ou و همکاران (۲۰۰۹) استفاده گردید که توالی آن‌ها برای ژن PIT۱ به صورت  $5' - \text{GGACCTCTCTAACAGCTCTC} - 3'$  و  $3' - \text{GGGAAGAATACAGGGAAAGG} - 5'$  و برای ژن STAT5B به صورت  $5' - \text{CCATCCCTTCCTGGTGCAGT} - 3'$  و  $3' - \text{ACTGCTGCCATTTCCCTTTG} - 5'$  می‌باشد. شرایط بهینه PCR با حجم نهایی ۱۲ میکرولیتر شامل ۶ میکرولیتر Master، آغازگرها هر کدام ۱/۵ میکرولیتر با غلظت ۱۰ پیکومول بر میکرولیتر، ۱/۵ میکرولیتر DNA با غلظت ۵۰ تا ۱۰۰ نانوگرم در میکرولیتر و ۱/۵ میکرولیتر آب مقطر دو بار تقطیر بود. برای ژن PIT۱ تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از یک مرحله ابتدایی واسرشته‌سازی در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰۰ ثانیه و ۳۵ چرخه شامل واسرشته‌سازی در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ ثانیه، دمای اتصال آغازگرها ۶۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ ثانیه، دمای تکثیر ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ ثانیه و یک دمای تکثیر نهایی ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۲۰ ثانیه انجام شد. برای ژن STAT5B تکثیر



شناسایی شد که به ترتیب دارای فراوانی ۰/۱۸، ۰/۳۵ و ۰/۴۷ بودند و فراوانی آلل‌های + و - به ترتیب ۰/۳۵۵ و ۰/۶۴۵ بود. بررسی تعادل هاردی-واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع برای هر دو ژن نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه‌های ژنی مورد نظر در تعادل نمی‌باشد. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که در ژن PIT1، اثر ژنوتیپ روی صفات وزن زنده در ۱۲ هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد و در ژن STAT5B، اثر ژنوتیپ روی صفات وزن زنده در ۸ هفتگی، وزن طحال و چربی حفره شکمی معنی‌دار است ( $p < 0.05$ ). مقایسات میانگین نشان داد که به‌طور معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) در ژن PIT1، خروس‌های با ژنوتیپ ++ و +- دارای میانگین وزن زنده ۱۲ هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد بیش‌تری در مقایسه با ژنوتیپ -- بودند (جدول ۱). در ژن STAT5B به‌طور معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) خروس‌های با ژنوتیپ -- دارای میانگین وزن زنده ۸ هفتگی و چربی حفره شکمی بیش‌تری در مقایسه با ژنوتیپ‌های +- و ++ بودند (جدول ۲). در بقیه موارد بین ژنوتیپ‌های جایگاه‌های ژنی مورد نظر با صفات مورد بررسی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.



شکل ۲: الگوهای RFLP حاصل از برش با آنزیم MspI برای ژن STAT5B  
M: نشانگر مولکولی ۱۰۰ جفت بازی. +/+، +/- و -/-: ژنوتیپ‌ها

در این تحقیق برای جایگاه مورد نظر در ژن PIT1 سه ژنوتیپ ++، +- و -- شناسایی شد که به ترتیب دارای فراوانی ۰/۵۷، ۰/۲۹ و ۰/۱۴ بودند و فراوانی آلل‌های + و - به ترتیب ۰/۷۱۵ و ۰/۲۸۵ بود. در جایگاه مورد نظر ژن STAT5B نیز سه ژنوتیپ ++، +- و --

جدول ۱: مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات ژنوتیپ‌های مختلف ژن PIT1 برای صفات رشد و لاشه (میانگین  $\pm$  خطای استاندارد) در مرغ بومی

ژنوتیپ	صفت		
	-/-	+/-	+/+
	۲۷۱/۴۸ $\pm$ ۲۰/۱۹	۲۸۹/۵۶ $\pm$ ۲۱/۰۵	۳۰۰/۴۴ $\pm$ ۱۸/۷۲
	۷۵۲/۱۰ $\pm$ ۵۱/۰۲	۷۹۵/۸۴ $\pm$ ۵۶/۲۷	۸۲۷/۱۲ $\pm$ ۵۲/۶۴
	۱۲۰۲/۱۴ $\pm$ ۶۵/۲۷ <sup>b</sup>	۱۴۱۶/۳۰ $\pm$ ۷۰/۸۸ <sup>a</sup>	۱۴۵۷/۵۳ $\pm$ ۶۸/۳۹ <sup>a</sup>
	۸۶۵/۸۴ $\pm$ ۵۳/۱۲ <sup>b</sup>	۱۰۲۹/۴۲ $\pm$ ۵۹/۳۳ <sup>a</sup>	۱۰۶۳/۶۱ $\pm$ ۵۶/۲۶ <sup>a</sup>
	۱۰/۲۴ $\pm$ ۰/۹۳	۱۰/۱۹ $\pm$ ۰/۹۰	۱۰/۵۴ $\pm$ ۰/۹۸
	۳۱/۱۸ $\pm$ ۱/۳۶ <sup>b</sup>	۳۶/۳۱ $\pm$ ۱/۷۲ <sup>a</sup>	۳۷/۴۷ $\pm$ ۱/۵۶ <sup>a</sup>
	۳۰/۴۹ $\pm$ ۱/۹۱	۳۱/۲۶ $\pm$ ۲/۱۵	۳۲/۸۴ $\pm$ ۲/۱۷
	۲/۳۸ $\pm$ ۰/۲۴	۲/۴۹ $\pm$ ۰/۲۷	۲/۵۶ $\pm$ ۰/۲۳
	۸/۷۸ $\pm$ ۱/۰۵	۹/۱۱ $\pm$ ۱/۰۲	۹/۶۱ $\pm$ ۱/۱۴
	۶/۱۸ $\pm$ ۰/۲۲	۶/۱۰ $\pm$ ۰/۳۲	۶/۲۳ $\pm$ ۰/۲۵
	۴۵/۹۶ $\pm$ ۱/۴۷	۴۶/۹۳ $\pm$ ۱/۱۵	۴۶/۱۷ $\pm$ ۱/۳۸
	۳/۵۲ $\pm$ ۰/۲۶	۳/۶۱ $\pm$ ۰/۳۲	۳/۷۵ $\pm$ ۰/۳۹

در هر ردیف میانگین‌های با حروف غیرمشترک، تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد دارند.



جدول ۲: مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات ژنوتیپ‌های مختلف ژن STAT5B برای صفات رشد و لاشه (میانگین ± خطای استاندارد) در مرغ بومی

صفت	ژنوتیپ		
	-/-	+/-	+/+
وزن زنده هفته ۴ (گرم)	۲۹۵/۸۱ ± ۲۰/۴۳	۲۸۲/۳۷ ± ۱۹/۶۱	۲۷۶/۰۴ ± ۱۹/۱۵
وزن زنده هفته ۸ (گرم)	۸۹۸/۵۷ ± ۴۵/۳۲ <sup>a</sup>	۷۳۴/۲۶ ± ۴۹/۱۸ <sup>b</sup>	۷۲۳/۱۰ ± ۴۷/۶۶ <sup>b</sup>
وزن زنده هفته ۱۲ (گرم)	۱۴۲۱/۵۱ ± ۶۳/۴۸	۱۳۵۹/۸۳ ± ۶۸/۴۵	۱۳۳۴/۳۷ ± ۷۱/۲۸
وزن لاشه (گرم)	۱۰۴۴/۵۷ ± ۶۲/۹۱	۹۹۴/۸۰ ± ۶۴/۳۷	۹۷۵/۷۹ ± ۶۴/۱۵
وزن قلب (گرم)	۱۰/۳۷ ± ۰/۹۴	۱۰/۲۴ ± ۰/۸۹	۱۰/۲۱ ± ۰/۹۵
وزن کبد (گرم)	۳۶/۱۹ ± ۱/۱۱	۳۵/۲۹ ± ۱/۳۱	۳۵/۰۵ ± ۱/۱۴
وزن سنگدان (گرم)	۳۲/۶۳ ± ۲/۱۴	۳۲/۱۷ ± ۲/۰۲	۳۱/۶۷ ± ۲/۲۴
وزن طحال (گرم)	۲/۴۱ ± ۰/۲۳	۲/۳۳ ± ۰/۲۳	۲/۵۸ ± ۰/۲۵
وزن چربی حفره شکمی (گرم)	۱۱/۱۶ ± ۱/۰۲ <sup>a</sup>	۷/۹۸ ± ۰/۹۱ <sup>b</sup>	۷/۵۴ ± ۱/۰۸ <sup>b</sup>
pH گوشت	۶/۱۴ ± ۰/۱۹	۶/۰۹ ± ۰/۲۷	۶/۲۹ ± ۰/۳۱
ظرفیت نگه‌داری آب گوشت (درصد)	۴۶/۰۲ ± ۱/۳۶	۴۶/۹۸ ± ۱/۲۰	۴۵/۹۲ ± ۱/۵۴
چربی داخل عضله‌ای (درصد)	۳/۶۴ ± ۰/۳۳	۳/۶۸ ± ۰/۳۵	۳/۵۵ ± ۰/۲۹

در هر ردیف میانگین‌های با حروف غیرمشترک، تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد دارند.

(Nie و همکاران، ۲۰۰۸). مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق محققین گزارش نمودند که بین چندشکلی ژن STAT5B با وزن بدن در جوجه گوشتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد (Niknafs و همکاران، ۲۰۱۴). محققین در تحقیقی که بر روی مرغ بومی انجام دادند، ارتباط معنی‌داری بین چندشکلی ژن STAT5B با صفات وزن بدن و تولیدمثل به دست آوردند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (Zhao و همکاران، ۲۰۱۲). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چندشکلی جایگاه‌های ژنی مورد نظر در ژن‌های PIT1 و STAT5B با برخی صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران ارتباط معنی‌داری دارد. بنابراین می‌توان با استفاده از اطلاعات به دست آمده فوق در شاخص‌های بهینه انتخاب، ضمن افزایش صحت انتخاب، پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب را برای صفات مذکور افزایش داد. شایان ذکر است به منظور پوشش دادن محدودیت‌های مربوط به انتخاب به کمک نشانگر، روش انتخاب ژنومی پیشنهاد می‌شود. انتخاب ژنومی، شکلی از انتخاب به کمک نشانگر است که در آن از نشانگرها در مقیاس کل ژنوم استفاده می‌شود.

## منابع

- دهقان زاده، ه.؛ میرحسینی، س.ض. و شادپرور، ع.، ۱۳۸۳. بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD. مجله پژوهش و سازندگی. شماره ۶۲، صفحات ۶ تا ۹.

## بحث

در تحقیق حاضر برای جایگاه مورد نظر ژن PIT1 بیشترین فراوانی ژنوتیپی آن مربوط به ژنوتیپ ++ و کمترین مربوط به ژنوتیپ -- بوده و همچنین بیشترین فراوانی آللی آن مربوط به آلل + و کمترین مربوط به آلل - است که با نتایج تحقیقات صورت گرفته بر روی اثر چندشکلی ژن PIT1 بر صفات رشد و لاشه در جوجه گوشتی مطابقت دارد (Rodbari و همکاران، ۲۰۱۱). در جایگاه مورد نظر ژن STAT5B بیشترین فراوانی ژنوتیپی آن مربوط به ژنوتیپ -- و کمترین مربوط به ژنوتیپ ++ بوده و همچنین بیشترین فراوانی آللی آن مربوط به آلل - و کمترین مربوط به آلل + است که با نتایج تحقیقات صورت گرفته بر روی چندشکلی ژن STAT5B در مرغ بومی مطابقت دارد (Ou و همکاران، ۲۰۰۹). عدم تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه، احتمالاً ناشی از کوچک بودن اندازه جمعیت مورد بررسی و یا سایر عوامل برهم زننده تعادل مانند انتخاب به دلیل اجرای برنامه‌های اصلاحی برای این پرندگان و همچنین انتخاب یک جنس در این جامعه می‌باشد. مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق، محققین گزارش کردند که چندشکلی ژن PIT1 بر میزان رشد و وزن بدن در جوجه گوشتی اثر معنی‌داری دارد (Bhattacharya و همکاران، ۲۰۱۲). همچنین در پژوهشی دیگر محققین چندشکلی ژن PIT1 را با صفات وزن بدن و لاشه بررسی و یک رابطه معنی‌دار بین این صفات و ژنوتیپ‌های حاصل از ژن PIT1 را گزارش نمودند



۱۶. **Woelfle, J. and Rotwein, P., 2004.** In vivo regulation of growth hormone-stimulated gene transcription by STAT5B. *American journal of physiology: Endocrinology and metabolism.* Vol. 286, pp: 393-401.
۱۷. **Zhao, X.H.; Wang, J.Y.; Zhang, G.X.; Wei, Y.; Gu, Y.P. and Yu, Y.B., 2012.** Single nucleotide polymorphism in the STAT5B gene is associated with body weight and reproductive traits of the Jinghai Yellow chicken. *Molecular Biology Reports.* Vol. 39, pp: 4177-4183.
۱۸. **Zwierzchowski, L.; Oprzadek, J.; Dymnicki, E. and Dzierzbicki, P., 2001.** An association of growth hormone. Kappa-casein, beta-lactoglobulin, leptin and pit-1 loci polymorphism with growth rate and carcass traits in beef cattle. *Animal Science Papers and Reports.* Vol. 19, No. 1, pp: 165-177.
۲. **نقوی، م؛ قره‌یاضی، ب. و حسینی‌سالکده، ق.، ۱۳۸۸.** نشانگرهای مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. ۳۴۰ صفحه.
۳. **Bai, J.Y.; Zhang, Q. and Jia, X.P., 2006.** Comparison of different foreground and background selection methods in marker-assisted introgression. *Acta Genetica Sinica.* Vol. 33, pp: 1073-1080.
۴. **Bhattacharya, T.K.; Chatterjee, R.N. and Priyanka, M., ۲۰۱۲.** Polymorphisms of Pit-1 gene and its association with growth traits in chicken. *Poultry Science.* Vol. 91, pp: 1057-1064.
۵. **Emara, M.G. and Kim, H., 2003.** Genetic markers and their application in poultry breeding. *Poultry Science.* Vol. 82, pp: 952-957.
۶. **Ghazikhani Shad, A.; Nejati Javaremi, A. and Mehrabani Yeganeh, H., 2007.** Animal model estimation of genetic parameters for most important economic traits in Iranian native fowls. *Journal of Biological Sciences.* Vol. 10, No. 16, pp: 2787-2789.
۷. **Havenstein, G.B.; Ferket, P.R. and Qureshi, M.A., 2003.** Growth, livability and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. *Poultry Science.* Vol. 82, pp: 1500-1508.
۸. **Hennighausen, L. and Robinson, G.W., 2008.** Interpretation of cytokine signaling through the transcription factors STAT5A and STAT5B. *Genes and development.* Vol. 22, No. 6, pp: 711.
۹. **Hillier, L.; Miller, W. and Birney, E., 2013.** Gallus gallus isolate #256 breed Red Jungle fowl, inbred line UCD001 chromosome 1, *Gallus gallus-4.0*, whole genome shotgun sequence. NCBI Reference Sequence. NC-006088.3.
۱۰. **Hillier, L.; Miller, W. and Birney, E., 2013.** Gallus gallus isolate #256 breed Red Jungle fowl, inbred line UCD001 chromosome 27, *Gallus gallus-4.0*, whole genome shotgun sequence. NCBI Reference Sequence. NC-006114.3.
۱۱. **Nie, Q.; Fang, M.; Xie, L.; Zhau, M.; Liang, Z.; Luo, Z.; Wang, G.; Bi, W.; Liang, C.; Zhang, W. and Zhang, X., ۲۰۰۸.** The <sup>1</sup>PIT gene polymorphism were associated with chicken growth traits. *BMC Genetics.* Vol. 9, pp: 20-29.
۱۲. **Niknafs, S.; Nejati Javaremi, A. and Sadeghi, M., 2014.** Single nucleotide polymorphism in BMPR-IB and STAT5B genes and their association with growth and reproductive traits in chicken. *Songklanakarin Journal of Science and Technology.* Vol. 36, No. 2, pp: 137-142.
۱۳. **Ou, J.T.; Tang, S.Q.; Sun, D.X. and Zhang, Y., 2009.** Polymorphisms of three neuroendocrine-correlated genes associated with growth and reproductive traits in the chicken. *Poultry Science.* Vol. 88, pp: 722-727.
۱۴. **Rodbari, Z.; Alipanah, M.; Seyedabadi, H.R. and Amirinia, C., 2011.** Identification of a single nucleotide polymorphism of the pituitary-specific transcriptional factor <sup>1</sup> (PIT<sup>1</sup>) gene and its association with body composition trait in Iranian commercial broiler line. *African Journal of Biotechnology.* Vol. 10, No. 60, pp: 12979-12983.
۱۵. **Song, C.; Gao, B.; Teng, Y.; Wang, X.; Wang, Z. and Li, Q., 2005.** Msp1 polymorphisms in the 3rd intron of the swine POU1F1 gene and their associations with growth performance. *Journal of Applied Genetics.* Vol. 46, No. 3, pp: 285-289.

