

مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

- مائدۀ قنبریان بروجنی*: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹
- مجتبی آهنی آذری: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹
- سعید حسنی: دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۴۹۱۳۸-۱۵۷۳۹
- محمدرضا عبادی: بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، صندوق پستی: ۸۱۷۸۵-۱۹۹

تاریخ دریافت: آذر ۱۳۹۵ تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۵

چگینیه

اووالبومین از جمله پروتئین‌های فعال ماتریکس پوسته تخم مرغ است که بر روی کلسیفیکاسیون پوسته تخم مرغ مؤثر می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه ارتباط چندشکلی دو ناحیه از اگزون ۸ ژن اووالبومین واقع بر روی کروموزوم شماره ۲ با برخی از صفات کیفیت خارجی تخم مرغ به کمک تکنیک‌های RFLP و SSCP در مرغان بومی اصفهان انجام شد. در این پژوهش DNA ژنومی از خون به کمک کیت استاندارد استخراج و نواحی مورد نظر به روش PCR تکثیر شدند. چندشکلی یک ناحیه با طول ۱۹۹ جفت باز به کمک تکنیک‌های Mn1-RFLP و SSCP و در ناحیه‌ای دیگر با طول ۷۴ جفت باز توسط تکنیک SSCP مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور تعیین ژنوتیپ مرغان، الکتروفورز ژل پلی‌اکریل‌آمید و رنگ‌آمیزی نیترات نقره استفاده شد. برای قطعه اول ۲ ژنوتیپ (A1A1 و A1A2) با روش RFLP و ۳ ژنوتیپ (B1B1، B1B2، B1B2) با روش PCR شناسایی شدند. برای قطعه دوم ۳ ژنوتیپ (C1C1، C1C2 و C2C2) مشاهده شد. بیشترین فراوانی‌های ژنوتیپی (B3B3) با روش SSCP شناسایی شدند. برای قطعه دوم ۳ ژنوتیپ (C1C1، C1C2 و C2C2) مشاهده شد. در تجزیه و تحلیل متعلق به الگوهای A1A1، A1B2 و B1B2 بود و میانگین‌های هتروزیگوستی به ترتیب $0/05$ ، $0/01$ و $0/33$ بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها هیچ کدام از صفات ارتباط معنی‌داری با قطعه ۱۹۹ جفت بازی نشان ندادند ($P > 0/05$). وزن تخم مرغ دارای ارتباط معنی‌داری با قطعه ۴۰۷ جفت بازی بود ($P < 0/05$) که ژنوتیپ C1C2 وزن سیکتری نسبت به دو ژنوتیپ دیگر داشت، اما ارتباط سایر صفات با این قطعه بی‌معنی بود ($P > 0/05$). نتایج به‌دست آمده نشان دادند که در مرغ بومی اصفهان ژن اووالبومین دارای چندشکلی نسبتاً بالایی است و می‌تواند در برنامه‌های اصلاح نژادی آینده مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: چندشکلی، ژن اووالبومین، صفات کیفیت خارجی تخم مرغ، مرغ بومی اصفهان



مقدمه

تخم مرغ ناشی از پیری مرغ و سطح اجزای ماتریکس وجود دارد. این رابطه با مطالعات ارتباط ژنتیکی بین چندشکلی در ژن‌های کد کننده پروتئین‌های ماتریکس پوسته تخم مرغ و اندازه‌گیری کیفیت پوسته تخم مرغ تأیید شده است (Gautron و Nys، ۲۰۰۶). نتایج تحقیق Hincke (۱۹۹۵) نشان داد که اووالبومین در طول فاز اولیه شکل‌گیری پوسته حاضر است که در پروتئین‌های ماتریکس بدن مامیلاری گنجانیده شده است. Hincke و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردند که از پروتئین‌های موجود در لایه مامیلاری درونی پوسته، اووالبومین نشانگری در ارتباط با اندازه کریستال می‌باشد. Zhang و همکاران (۲۰۱۵) آزمایشی با هدف مطالعه چندشکلی‌های نوکلئوتیدی صفات سازمان فراساختاری پوسته تخم مرغ بر روی مرغ‌های لاین خالص سفیدرود آیلند انجام دادند که اووالبومین به طور قابل توجهی با ضخامت مؤثر و اندازه مخروط‌های مامیلاری مرتبط بود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی چندشکلی موجود در دو ناحیه از اگرون ۸ ژن اووالبومین واقع بر کروموزوم شماره ۲ و ارتباط آن‌ها با صفات کیفیت پوسته تخم مرغ و نیز تعیین فراوانی‌های آللی و ژنتیکی برای این جایگاه‌های ژنی در مرغان بومی اصفهان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

تحقیق حاضر در سال ۱۳۹۴ بر روی مرغان مرکز تکثیر و اصلاح نژاد اصفهان انجام شد. این مرغان در شرایط کنترل شده سالن در قفس‌های انفرادی نگهداری می‌شدند. ابتدا ۱۵۰ قطعه از این مرغان به طور تصادفی انتخاب و از هر مرغ دو نمونه تخم مرغ Dunn و همکاران، (۲۰۰۸) در سن‌های ۶۰ و ۶۴ هفتگی به منظور بررسی اثر ژن اووالبومین در سنین بالاتر بر روی خصوصیات کیفیت پوسته با در نظر گرفتن پایین بودن مقاومت و درصد پوسته در این سنین در مرغان مورد تحقیق، گرفته شد. خصوصیات مورد نظر در تخم مرغ‌ها اندازه‌گیری Sun و همکاران، (۲۰۱۵) و میانگین آن‌ها برای بیان نمودن کیفیت پوسته تخم مرغ در نظر گرفته شد (Zhang و همکاران، ۲۰۱۵). همچنین نمونه خون از ورید بال هر مرغ گرفته و داخل لوله‌های EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid) جمع‌آوری (قره‌ویسی، ۱۳۹۱) و سپس در فریزر -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا قبل از استخراج DNA ذخیره شد (Zhang و همکاران، ۲۰۱۵؛ قره‌ویسی، ۱۳۹۱).

اندازه‌گیری خصوصیات کیفیت پوسته تخم مرغ: اندازه‌گیری خصوصیات کیفیت پوسته تخم مرغ در بخش علوم دامی مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. برای ارزیابی پارامترهای کیفیت پوسته تخم مرغ وزن تخم مرغ توسط

مهم‌ترین هدف در اصلاح نژاد مرغان تخم‌گذار تولید تخم‌مرغ‌های با کیفیت است (Mahrous و همکاران، ۲۰۱۳). بهبود صفات کیفیتی تخم مرغ با انتخاب سنتی مشکل است، بهدلیل این که اندازه‌گیری فنوتیپی آن‌ها دشوار یا وقت‌گیر و در برخی موارد همبستگی ژنتیکی نامطلوب با دیگر صفات تولیدی مهم وجود دارد. انتخاب مستقیم بر اساس نشانگرها ژنتیکی تا حد زیادی ممکن است اصلاح صفات کیفیتی تخم مرغ را بالا ببرد (Vilkki، ۲۰۰۷). کیفیت پوسته تخم مرغ در صنعت طیور مهم و یکی از مشکلات عمده تولید تخم مرغ است (Fan و همکاران، ۲۰۱۳؛ Radwan و همکاران، ۲۰۱۰). خسارت ناشی از پوسته‌های آسیب‌دیده تخم‌مرغ‌ها، علت زبان اقتصادی قابل توجهی (حدود ۸ تا ۱۱ درصد از کل تولید) در صنعت تخم مرغ و یک تهدید برای سلامت انسان (با نفوذ آلودگی و پاتogen‌ها به محظیات تخم مرغ) است (Fan و همکاران، ۲۰۱۳؛ Dunn و همکاران، ۲۰۱۲؛ Sun و همکاران، ۲۰۱۲). پوسته تخم مرغ یک ساختار بسیار منظم و متخلخل متشکل از مواد معدنی (۹۵ درصد کربنات کلسیم) مرتبط با ماتریکس آلی (شامل؛ پروتئین‌ها، گلیکوپروتئین‌ها و پروتئوگلیکان‌ها) است (Zhang و همکاران، ۲۰۱۵؛ Radwan و همکاران، ۲۰۱۰؛ Gautron و همکاران، ۲۰۰۹). پوسته تخم مرغ یک مانع محافظتی در برابر آسیب‌های فیزیکی و نفوذ پاتogen‌ها از محیط خارجی است، و از نظر بیولوژیکی تنظیم‌کننده مبادله آب و گازها به عنوان یک عضو تفسی و همچنین یک منبع کلسیم برای رسوب در استخوان برای جنبین در حال رشد می‌باشد (Sun و همکاران، ۲۰۱۳؛ Fan و همکاران، ۲۰۱۵؛ Gautron و Nys، ۲۰۰۶). ماتریکس آلی اگرچه مقدارش (به خصوص پروتئین‌های آن)، در لایه‌های کلسیفیه تنها ۲/۵ درصد است، از اهمیت زیادی برای رسوب یون‌های بی‌کربنات و کلسیم، و تأثیر در بافت، خواص بیومکانیکی و مقاومت پوسته تخم مرغ با کنترل بر روند رشد، شکل، اندازه و چهت‌گیری کریستال کلسیت برخوردار است (Liu و همکاران، ۲۰۱۳؛ Liu، ۲۰۰۸). در بخش محلول اسیدی ماتریکس، ۵۲۰ پروتئین (از جمله اووالبومین) شناخته شده‌اند (Liu و همکاران، ۲۰۱۳). اووالبومین یک گلیکوپروتئین با یک زنجیره منفرد کربوهیدرات متعلق شده به آسپارژین ۲۹۳ است و متشکل از ۳۸۶ اسید‌آمینه (Mine، ۲۰۰۸) و از جمله پروتئین‌های فعل ماتریکس (بدون مراحل رسوب) است (Miksik و همکاران، ۲۰۱۰) که ممکن است در تنظیم رشد کلسیت در طول کلسیفیکاسیون پوسته تخم مرغ درگیر باشد (Mine، ۲۰۰۸). به علاوه، کیفیت پوسته تخم مرغ با پیری مرغان تخم‌گذار کاهش می‌یابد (Sun و همکاران، ۲۰۱۵؛ پیرانی و همکاران، ۱۳۸۸). یک رابطه بین تغییرات در خواص مکانیکی پوسته



مولکولی این تحقیق در آرمايشگاه ژنتیک دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. DNA ژنومی از ۵۰ میکرولیتر از هر نمونه خون (Goto و همکاران، ۲۰۱۴) به کمک کیت (شرکت سیناژن) استخراج و بعد از شست و شو با اتانول ۷۰ درصد Huang و همکاران، ۲۰۱۳، قره‌ویسی و همکاران، ۱۳۹۱ در میکروتیپ در بافر TE (PH=۷/۵) حل و جهت انجام PCR در فریزر ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (Hou و همکاران، ۲۰۱۰). کمیت DNA استخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر و کیفیت آن با الکتروفورز ژل آگارز ۸/۰ درصد تعیین شد (پیرانی و همکاران، ۲۰۰۰). واکنش‌های PCR در حجم‌های ۲۵ میکرولیتر شامل؛ ۱۲/۵ نانوگرم DNA ژنومی، ۰/۱ میکرومول از هر آغازگر (جدول ۱)، ۰/۱ میکرولیتر کیت PCR (شرکت سیناژن)، آب مقطر استریل تا حجم ۲۵ میکرولیتر و روغن معدنی طبق برنامه جدول ۲ انجام شد. برای مشاهده محصولات PCR، الکتروفورز ژل آگارز ۱ درصد که با Safe Stain رنگ‌آمیزی شده بود، با ولتاژ ۹۵ ولت به مدت ۱ ساعت انجام شد و بعد به وسیله لامپ UV رؤیت و عکس برداری شد (Huang و همکاران، ۲۰۱۳؛ قره‌ویسی و همکاران، ۱۳۹۱).

ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۱ گرم اندازه‌گیری شد. برای محاسبه شاخص شکل تخم مرغ (طول و عرض) توسط کولیس (Radwan و همکاران، ۲۰۱۰) با دقت میلی‌متر و سپس مقاومت پوسته به وسیله مقاومت سنج (Sun و همکاران، ۲۰۱۲؛ Sun و همکاران، ۲۰۱۵) با مقیاس سانتی‌متر مربع بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد. پس از آن، تخم مرغ‌ها شکسته شده و محتويات داخلی حذف و پوسته‌ها با آب شسته و در دمای اتاق (Sun و همکاران، ۲۰۱۵) به مدت ۴۸ ساعت خشک شد (Panheleux و همکاران، ۲۰۰۰)، سپس وزن آن‌ها توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۱ گرم و ضخامت کل پوسته تخم مرغ در سه نقطه مختلف در قسمت وسط تخم مرغ (Radwan و همکاران، ۲۰۱۰)، با استفاده از ضخامت سنج (Sun و همکاران، ۲۰۱۲؛ Sun و همکاران، ۲۰۱۵) با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. از روابط زیر درصد پوسته (Radwan و همکاران، ۲۰۱۰؛ Mahrous و همکاران، ۲۰۱۳) و شاخص شکل تخم مرغ (Dunn و همکاران، ۲۰۰۸) محاسبه شد.

$$\text{شاخص شکل تخم مرغ} = \frac{\text{عرض تخم مرغ}}{\text{طول تخم مرغ}} = \frac{\text{وزن پوسته}}{\text{وزن تخم مرغ}} * 100$$

استخراج DNA و واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)

آزمایشات

جدول ۱: توالی آغازگرهای مورد استفاده برای هر یک از نواحی ژنی


	طول رشتہ (جفت باز)	توالی (۳.....۵)	آغازگر	قطعه	ناحیه ژنی
۱۹۹		GAGTCATCACACTGAAAAATGC	رفت	قطعه اول	اووالبومین
		CAGGAACACAGAGAACAGCA	برگشت	۶۷۹۴۸۸۹۱ تا ۶۷۹۴۸۶۹۲ از باز (۸ اگزون)	
۴۰۷		CAAACACATCGCAACCAACG	رفت	قطعه دوم	اووالبومین
		CTGGAGCACCTTGGTCATACA	برگشت	۶۷۹۴۸۷۹۹ تا ۶۷۹۴۸۳۹۲ از باز (۸ اگزون)	

جدول ۲: برنامه دمایی و زمانی به کار رفته شده در واکنش PCR برای هریک از نواحی ژنی


	تعداد سیکل‌ها	دما (سانتی‌گراد)	زمان (ثانیه)	مراحل	ژن
۳۵	۱۲۰	۹۵		واسرشت‌سازی اولیه	اووالبومین (۱۹۹ جفت باز)
		۹۵		واسرشت‌سازی	
		۵۱/۶		اتصال	
		۷۲		بسط	
	۳۶۰	۷۲		بسط نهایی	
۳۵	۱۲۰	۹۵		واسرشت‌سازی اولیه	اووالبومین (۴۰۷ جفت باز)
		۹۴		واسرشت‌سازی	
		۵۵		اتصال	
		۷۲		بسط	
	۴۲۰	۷۲		بسط نهایی	



۳ آورده شده که بیشترین فراوانی‌های آللی به ترتیب متعلق به آلل-های A₁, B₁, C₂ و بیشترین فراوانی‌های ژنتیپی به ترتیب متعلق به ژنتیپ‌های A₁A₁, A₁B₂, C₂C₂ می‌باشد. در بررسی چندشکلی پروتئین اووالبومین در سفیده تخم اردک موسکوی (Muscovy) و مالارد (Mallard) ۲ ال A و B با فراوانی‌های الی ۰/۴۵ و ۰/۵۵ مشاهده شد. AA و AB را با میانگین هتروزیگوستیه ۰/۴۹ مشاهده شد (Akinyemi و Dunn, ۱۹۷۴) و برای اردک‌های مغلانگ شد (Maglang), تگال (Tegal) و موجوساری (Mojosari) ۲ ال A و B مشاهده شد که در هر سه نژاد فراوانی ال A بیشتر از B بود و میانگین هتروزیگوستیه به ترتیب ۰/۳۶ و ۰/۴۰ گزارش شد (Johari و همکاران, ۲۰۱۳). که این نتایج نزدیک به نتایج تحقیق حاضر می‌باشد ولی Obeidah و همکاران (۱۹۷۷) در بررسی مشابه بر روی مرغ فایومی (Fayoumi) تنها ژنتیپ هموزیگوت AA را مشاهده کردند. تعادل هاردی- واینبرگ با استفاده از آزمون کای اسکور در جمعیت مرغان بومی اصفهان بررسی شد (جدول ۳). برای ناحیه ۱۹۹ جفت بازی جمعیت در حالت تعادل هاردی- واینبرگ قرار نداشت که می‌توان نتیجه گرفت که آلل‌های موجود در این جایگاه تحت تاثیر عوامل تغییر هنده فراوانی‌های آللی و ژنتیپی قرار گرفته‌اند که ظاهراً انتخابی در مرغ‌های این جمعیت در جهت افزایش یا کاهش صفات ژنتیکی مورد نظر صورت گرفته است.



شکل ۱: کمیت و کیفیت استخراج شده از نمونه‌های خون



شکل ۲: الکتروفورز محصول PCR ناحیه با طول ۱۹۹ جفت باز (a) و ناحیه با طول ۴۰۷ جفت باز (b)

واکنش هضم آنزیمی (RFLP) یا **روش چند شکلی فضایی رشته‌های منفرد (SSCP)** یا **PCR میکرولیتر** براساس دستور هضم آنزیمی؛ محصول ۱۰ PCR میکرولیتر ۰/۱۵ میکروگرم، آب مقطر استریل ۱۸ میکرولیتر، بافر یونیورسال ۲ میکرولیتر و آنزیم ۱ Mn11 در تحقیقی مشابه توسط Dunn و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شده بود) ابتدا مخلوط و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد برای ۱۶ ساعت درون انکوباتور قرار داده شد. جهت رؤیت محصول برش یافته، الکتروفوروز ژل پلی‌اکریل آمید ۸ درصد با ولتاژ ۲۵۰ ولت به مدت ۴ ساعت انجام گرفت و سپس ژل برای مشاهده باندهای حاصل از هضم آنزیمی محصول PCR به کمک نیترات نقره رنگ‌آمیزی شد. برای تجزیه محصولات PCR، Huang و روش (SSCP) ۳ میکرولیتر از هر یک از محصولات PCR و همکاران، ۲۰۱۳) به همراه ۱۳ میکرولیتر بافر دناتوره کننده مخلوط گردید و تحت دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه قرار گرفته و سپس نمونه‌ها سریعاً برای ممانعت از اتصال مجدد رشته‌های مکمل به داخل یخ منتقل شدند. به منظور مشاهده ژنتیپ‌ها، الکتروفوروز ژل پلی‌اکریل آمید و رنگ‌آمیزی نیترات نقره مشابه قبل انجام شد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: محاسبه فراوانی ژنی و ژنتیپی و هم‌چنین آزمون χ^2 برای بررسی تعادل هاردی- واینبرگ این ژن با استفاده از نرم‌افزار POPGENES ۳۲ انجام شد. بررسی ارتباط بین ژنتیپ‌های حاصل از ژن اووالبومین با داده‌های ژنتیکی از مدل زیر به کمک روش GLM نرم‌افزار SAS انجام شد.

$$Y_{ijk} = \mu + h_i + G_j + e_{ijk}$$


Y_{ijk} مقدار ژنتیپ صفت مورد نظر، μ میانگین کل، h_i اثر نوبت جوجه‌کشی، G_j اثر ژنتیپ، e_{ijk} اثر تصادفی باقی مانده می‌باشند.

نتایج

های استخراج شده دارای غلظت بالا و از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند (شکل ۱). اندازه قطعات تکثیر شده بعد از انجام واکنش PCR برای دو ناحیه از اگرون ۸ ژن اووالبومین به ترتیب ۱۹۹ و ۴۰۷ جفت باز بود (شکل ۲). هضم ناحیه ۱۹۹ جفت بازی توسط آنزیم محدود الایرانی Mn11، ۲ الگوی ژنتیپی A₁A₁ و A₁A₂ تولید نمود و منجر به تولید آلل‌های A₁ و A₂ شد. در تجزیه و تحلیل SSCP نواحی B₁B₂, B₁B₁ و ۴۰۷ جفت بازی، به ترتیب ۳ الگوی ژنتیپی (B₃B₃, C₁C₂, C₁C₁) مشاهده شد (شکل ۳). فراوانی‌های ژنتیپی و آللی حاصل از RFLP و SSCP در جدول ۴

مرغان مرکز تکثیر و اصلاح نژاد اصفهان در جهت بهبود صفات تولیدی و عملکردی بهخصوص تعداد تخمرغ، وزن تخمرغ، سن بلوغ جنسی و وزن بدن (در ۱ روزگی، ۸ هفتگی و هنگام بلوغ جنسی) تحت انتخاب و جفت‌گیری غیرتصادفی بوده‌اند. انتخاب وجفت‌گیری غیرتصادفی از عوامل تغییردهنده تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت می‌باشدند. با توجه به تحقیق امامقلی‌بکلی و همکاران (۱۳۸۹) بر روی مرغان بومی یزد، صفات تخمرغ با صفات عملکردی و تولیدی مذکور دارای ارتباط می‌باشند که در نهایت می‌توان چنین بیان کرد که انتخاب برای بهبود صفات مذکور در مرغان بومی اصفهان تغییر در فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی در رابطه با سایر صفات (صفات کیفیت تخمرغ) را بهمراه داشته که در تحقیق حاضر شاهد عدم تعادل هاردی- واینبرگ برای ناحیه ۱۹۹ جفت بازی بودیم.

همان‌طور که نتایج مقایسه میانگین‌های صفات کیفیت خارجی تخمرغ در جدول ۴ نشان می‌دهد، اثر ژنوتیپ‌های حاصل از دو روش RFLP و SSSP ناحیه ۱۹۹ جفت بازی بر تمام صفات مورد بررسی بی معنی بود. اثر ژنوتیپ‌های SSCP ناحیه ۱۹۹ جفت بازی تنها بر صفت وزن تخمرغ معنی‌دار بود که ژنوتیپ C_1C_2 با میانگین C_1C_1 ۵۹/۵۴±۰/۶۷ گرم به طور معنی‌داری ($P<0/05$) از ژنوتیپ‌های C_2C_2 و C_1C_2 سبک‌تر بود.



شکل ۳: الگوهای RFLP حاصل از هضم با آنزیم (a) Mn11 و (b) SSCP محصولات PCR ناحیه ۱۹۹ جفت بازی و الگوهای (c) SSCP محصولات PCR ناحیه ۴۰۷ جفت بازی

جدول ۳: فراوانی‌های ژنوتیپی و آللی دو روش SSCP و RFLP

میانگین هتروزیگوستیه	χ^2	فراوانی آللی	آل	فراآنی ژنوتیپ	ژنوتیپ	زن
۰/۳۳	۱۰/۳۰***	۰/۷۹ ۰/۲۱	A ₁ A ₂	۰/۵۸ ۰/۴۲	A ₁ A ₁ A ₁ A ₂	اووالبومین (۱۹۹ جفت بازی) Mn11-RFLP
۰/۵۱	۲۹۸/۸۷***	۰/۵۴ ۰/۴۵ ۰/۰۱	B ₁ B ₂ B ₃	۰/۱۰ ۰/۸۹ ۰/۰۱	B ₁ B ₁ B ₁ B ₂ B ₃ B ₃	اووالبومین (۱۹۹ جفت بازی) SSSP
۰/۳۳	۲/۸۵	۰/۲۱ ۰/۷۹	C ₁ C ₂	۰/۰۷ ۰/۲۸ ۰/۶۵	C ₁ C ₁ C ₁ C ₂ C ₂ C ₂	اووالبومین (۴۰۷ جفت بازی) SSCP

(P<0/1) *** -

دلایل عده آن می‌تواند سن بالاتر مرغان در تحقیق حاضر باشد. باید در نظر گرفت شود که با افزایش سن مرغ، اندازه (طول و عرض) و وزن تخمرغ آن افزایش و ضخامت پوسته بدون تغییر باقی خواهد ماند اما مقاومت آن کاهش می‌یابد که دلیل آن می‌تواند کاهش میزان رسوب کلسیم در واحد سطح پوسته باشد (Goto و همکاران، ۲۰۱۴؛ Sun و همکاران، ۲۰۱۲) و همچنین تغییر در بافت پوسته که نشان داده شده است غلظت اووالبومین بالاتر (577 ± 94 در مقابل 293 ± 28 میلی گرم/گرم پروتئین، $P=0/012$) در پوسته تخمرغ‌های مرغان

میانگین صفات خارجی تخمرغ به همراه اثر نوبت جوجه‌کشی در جدول ۵ آورده شده است. در مقایسه با تحقیق صورت گرفته توسط صالحی‌نسب (۱۳۹۱) بر روی مرغان بومی اصفهان در سن ۲۸ تا ۳۲ هفتگی میانگین وزن تخمرغ و پوسته آن (به ترتیب $54/6$ و $5/۰۰$ گرم)، طول و عرض تخمرغ (به ترتیب $۵/۴۲$ و $۴/۲۲$ سانتی‌متر)، شاخص شکل تخمرغ ($۰/۷۷$ ، مقاومت پوسته تخمرغ ($۳/۴۴$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) و ضخامت آن ($۰/۳۸$ میلی‌متر) گزارش شد که در این تحقیق وزن تخمرغ سنگین‌تر و مقاومت پوسته کم‌تر بود. از

صالحی نسب (۱۳۹۱) در مورد صفات وزن، طول، عرض، شاخص شکل تخم مرغ و وزن پوسته تخم مرغ معنی دار گزارش شد. ولی در تحقیق حاضر تنها در مورد صفات طول تخم مرغ، وزن و ضخامت پوسته تخم مرغ معنی دار بود.

پیتر نسبت به جوان‌ها بوده است (Panheleux و همکاران، ۲۰۰۰) هم‌چنین غلظت اووالبومین در عصاره پوسته جمع‌آوری شده در مرغان جوان زمانی که مقاومت پوسته بالاتر می‌باشد، پایین‌تر است (Gautron و Nys، ۲۰۰۶). اثر نوبت جوجه‌کشی در تحقیق صورت گرفته توسط

جدول ۴: میانگین حداقل مربعات (LSM \pm SE) اثر الگوهای ژنتیکی مختلف اووالبومین بر صفات کیفیت خارجی تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان

زنوتیپ‌ها									صفات کیفیت خارجی تخم مرغ
SSCP اووالبومین (۱۹۹ جفت بازی)				SSSP اووالبومین (۱۹۹ جفت بازی)				Mnl1-RFLP اووالبومین (۱۹۹ جفت بازی)	
C ₁ C ₂	C ₁ C ₁	C ₁ C ₁	B ₁ B ₃	B ₁ B ₂	B ₁ B ₁	A ₁ A ₂	A ₁ A ₁		
۶/۵۹ \pm ۰/۴۹	۵/۵۴ \pm ۰/۶۷	۶/۳۳ \pm ۱/۳۸*	۶/۰/۹ \pm ۲/۱۴	۶/۱/۲۳ \pm ۰/۳۸	۵/۹/۶۶ \pm ۱/۲۸	۶/۱/۳۹ \pm ۰/۵۶	۶/۰/۹۳ \pm ۰/۴۹	وزن تخم مرغ (گرم)	
۵/۷۲ \pm ۰/۰۲	۵/۶۵ \pm ۰/۰۳	۵/۷۵ \pm ۰/۰۷	۵/۵۷ \pm ۰/۱۶	۵/۷۱ \pm ۰/۱۲	۵/۶۴ \pm ۰/۰۶	۵/۶۹ \pm ۰/۰۳	۵/۷۱ \pm ۰/۰۲	طول تخم مرغ (سانتی‌متر)	
۴/۳۹ \pm ۰/۰۱	۴/۴۵ \pm ۰/۰۲	۴/۴۲ \pm ۰/۰۴	۴/۴۸ \pm ۰/۰۹	۴/۴۸ \pm ۰/۰۱	۴/۴۸ \pm ۰/۰۴	۴/۴۹ \pm ۰/۰۲	۴/۴۷ \pm ۰/۰۱	عرض تخم مرغ (سانتی‌متر)	
۰/۷۷ \pm ۰/۰۳	۰/۷۷ \pm ۰/۰۴	۰/۷۷ \pm ۰/۰۱	۰/۸۱ \pm ۰/۰۲	۰/۷۷ \pm ۰/۰۳	۰/۷۸ \pm ۰/۰۱	۰/۷۷ \pm ۰/۰۴	۰/۷۷ \pm ۰/۰۳	شاخص شکل تخم مرغ	
۲/۲۲ \pm ۰/۰۷	۲/۱۴ \pm ۰/۱۱	۲/۲۰ \pm ۰/۲۳	۱/۶۴ \pm ۰/۵۱	۲/۲۱ \pm ۰/۰۶	۲/۱۷ \pm ۰/۲۱	۲/۲۰ \pm ۰/۹	۲/۲۱ \pm ۰/۰۸	مقاومت پوسته (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	
۵/۳۲ \pm ۰/۰۵	۵/۱۴ \pm ۰/۰۸	۵/۳۶ \pm ۰/۱۶	۴/۷۹ \pm ۰/۲۵	۵/۳۲ \pm ۰/۰۴	۵/۰/۴۰ \pm ۰/۱۴	۵/۴۹ \pm ۰/۰۶	۵/۲۷ \pm ۰/۰۵	وزن پوسته (گرم)	
۰/۳۹ \pm ۰/۰۲	۰/۳۸ \pm ۰/۰۴	۰/۳۹ \pm ۰/۰۱	۰/۳۵ \pm ۰/۰۹	۰/۳۹ \pm ۰/۰۲	۰/۳۸ \pm ۰/۰۱	۰/۳۹ \pm ۰/۰۳	۰/۳۷ \pm ۰/۰۲	ضخامت پوسته (میلی‌متر)	
۸/۶۱ \pm ۰/۰۷	۸/۴۶ \pm ۰/۱۱	۸/۵۵ \pm ۰/۲۳	۷/۵ \pm ۰/۰۵	۸/۵۹ \pm ۰/۱۶	۸/۴۹ \pm ۰/۲۱	۸/۵۷ \pm ۰/۰۹	۸/۸۵ \pm ۰/۰۸	درصد پوسته	

- مقایسه میانگین‌ها بهروش توکی با دقت ۵ درصد جامد شد.

جدول ۵: میانگین صفات خارجی تخم مرغ به همراه اثر ثابت نوبت جوجه‌کشی بر آن‌ها

صفات کیفیت خارجی تخم مرغ	وزن تخم مرغ (گرم)	طول تخم مرغ (سانتی‌متر)	عرض تخم مرغ (سانتی‌متر)	شاخص شکل تخم مرغ	مقاومت پوسته (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	وزن پوسته (گرم)	ضخامت پوسته (میلی‌متر)	دراصد پوسته	پوسته
میانگین	۶/۱/۱۱	۵/۷۰	۴/۳۸	۰/۷۷	۵/۲۷	۰/۳۹	۵/۲۷	۰/۰۶	دراصل
حداکثر	۴/۹/۹۶	۵/۱۶	۴/۰۳	۰/۶۷	۰/۳۵	۰/۸۲	۰/۳۲	۰/۰۲	حداکثر
حداکثر	۷۳/۹۸	۶/۵۲	۴/۶۹	۰/۸۶	۰/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	انحراف استاندارد
ضریب تغیرات	۷/۰۶	۳/۸۳	۲/۷۹	۰/۱۲	۰/۷۲	۰/۷۷	۰/۴۹	۰/۰۳	آخر نوبت جوجه‌کشی
آخر نوبت جوجه‌کشی	*	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	- سطح معنی‌داری: ns (بی معنی)، * (P<0/05)، ** (P<0/01).

الگوی دیگر بود. در تحقیق حاضر، در بررسی صفات ضخامت و مقاومت هیچ ارتباط معنی داری با دو ناحیه مورد نظر از ژن اووالبومین مشاهده نشد که در مخالفت با تحقیقات صورت گرفته توسط Dunn و همکاران (۲۰۰۸) و Bing (۲۰۱۴) می‌باشد. دلیل عدمه آن می‌تواند متفاوت بودن سطح بیان ژن اووالبومین در سنین مختلف باشد که می‌توان نتیجه گرفت این ژن بر روی کیفیت این صفات در سنین پایین‌تر مؤثرتر می‌باشد تا در سنین بالاتر. در این تحقیق، اثر ژنتیکی‌های Bing (۲۰۱۴) نیز ارتباطی بین ژن اووالبومین و حاصل از SSCP ناحیه ۴۰۷ جفت بازی تهها بر صفت وزن تخم مرغ معنی دار بود که ژنتیک C₁C₂ با میانگین ۵/۹/۵۴ \pm ۰/۶۷ گرم به طور معنی داری (P<0/05) از ژنتیک‌های C₁C₁ و C₂C₂ سبک‌تر بود. AA و BB دارای ارتباط با وزن تخم مرغ بود که ژنتیک AA تخم مرغ‌های سنگین‌تری نسبت به دیگر ژنتیک‌ها داشت که در موافق با این تحقیق می‌باشد. ولی در تحقیق صورت گرفته توسط

نتایج میانگین‌های حداقل مربعات ژنتیکی‌های حاصل از روش‌های RFLP و SSSP ناحیه ۱۹۹ جفت بازی برای تمام صفات کیفیت خارجی تخم مرغ تفاوت معنی داری نداشتند اما، در بررسی مشابهی بر روی این ناحیه، Dunn و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که اووالبومین بر ضخامت کل، ضخامت مؤثر، تغییر شکل و مقاومت پوسته بسیار مؤثر است و همچنین ژنتیک‌های هتروزیگوت مطلوبیت کمتر فنوتیپی شامل پوسته نازک‌تر، مقاومت کمتر و تغییر شکل بیش‌تر نشان دادند. Dunn و همکاران (۲۰۱۱) نشانگر اووالبومین را مرتبط با اندازه کریستال در پوسته تخم مرغ مرغان رود آیلند قرمز دانستند که در بررسی آن‌ها ۳ الگوی ژنتیکی مشاهده شد که الگوی شماره ۲ دارای کریستال‌های کوچک‌تری نسبت به دو

بحث



تشکر و قدردانی

از کلیه کارکنان مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان اصفهان به خصوص مهندس فقیه، مهندس جهانبخش و مهندس عمومی هادی و مهندس یقینی و مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بهخصوص مهندس صفا که در جمع آوری داده‌های این تحقیق همکاری لازم را داشتند، و نیز حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که اعتبار لازم جهت انجام این تحقیق را فراهم نمودند کمال تشکر به عمل می‌آید.

منابع

۱. امامقلی‌بگلی، ح؛ زرهداران، س؛ حسنی، س؛ خان‌احمدی، ع. ر. و عباسی، م. ع.. ۱۳۸۹. برآورد همبستگی زنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد. مجله پژوهش‌های علوم دامی. دوره ۴، شماره ۱، صفحات ۸۹ تا ۹۷.
۲. پیرانی، ن. ا؛ محمد‌هاشمی، آ؛ علیجانی، ص؛ رضازاده‌گلی، ر. و قنبری، ص.. ۱۳۸۸. تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. دوره ۱، شماره ۲، صفحات ۵۳ تا ۶۶.
۳. صالحی‌نسب، م.. ۱۳۹۱. برآورد پارامترهای زنتیکی و ردیابی ژنهای بزرگ اثر برای برخی صفات اقتصادی مرغ‌های بومی استان اصفهان با استفاده از روش‌های مختلف آماری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۴. قره‌ویسی، ش. ا؛ ایرانی، م؛ عبدالله‌پور، ع. ا. و عباسی، ح. ع.. ۱۳۹۱. بررسی چندشکلی اگزون ۹ و ۱۱ ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران با روش PCR-RFLP. مجله زنتیک نوین. دوره ۷، شماره ۲، صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۸.
۵. Akinyemi, M.O.; Osaiywu, O.H. and Ajayi, A.Y., 2014. Biochemical characterisation of Muscovy and Mallard ducks in Nigeria. I.J.S.N. Vol. 5, No. 3, pp: 557-562.
۶. Bing, L., 2014. Influence of Eggshell Ultrastructural Organization on Hatchability and Candidate Genes Associated with Eggshell Quality Traits. (Doctoral dissertation), China Agricultural University. Dissertation URL:/showinfo-194-683665-0.html.
۷. Bvanendranv, U., 1967. Egg-white polymorphisms and economic characters in domestic fowl. British Poultry Science. Vol. 8, pp: 119-129.
۸. Dunn, I.C.; Joseph, N.T.; Bain, M.; Edmond, A.; Wilson, P.W.; Milona, P.; Nys, Y.; Gautron, J.; Schmutz, M.; Preisinger, R. and Waddington, D., 2008. Polymorphisms in eggshell organic matrix genes are associated with eggshell quality measurements in pedigree Rhode Island Red hens. Animal Genetics. Vol. 40, pp: 110-114.
۹. Dunn, I.C.; Rodriguez Navarro, A.B.; McDade, K.; Schmutz, M.; Preisinger, R.; Waddington, D.; Wilson, P. W. and Bain, M.M., 2012. Genetic variation in eggshell crystal size and orientation is large and these traits are

Huang و همکاران (۲۰۱۳)، این ناحیه در اردک برای صفت وزن تخم مرغ معنی‌دار نبود ولی با توجه به ۳ ژنوتیپ TT، TC و CC رؤیت شده، جوچه‌درآوری در تخم مرغ‌های بارور با ژنوتیپ TT و CC در مقایسه با ژنوتیپ TC به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) بیشتر بود. اووالبومین می‌تواند تنظیم کننده توسعه جنین باشد و جهش در ژن اووالبومین مرگ و میر جنین را افزایش می‌دهد. در آنالیز توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، جایگزینی اشتباه هیستیدین با تیروزین را در اووالبومین شناسایی کردند. هم‌چنین در بررسی ژن اووالبومین در جمعیت مرغ بومی هینادری یک جهش نقطه‌ای آسپارژین با آسپارتیک اسید در موقعیت ۸۰۳۲ در منطقه اگزون ۸ بین ال‌های OV^B و OV^A مشاهده شد (Kinoshita و همکاران، ۲۰۰۳).

با توجه به تحقیقات صورت گرفته بر روی ژن اووالبومین، این ژن به عنوان یک نشانگر مؤثر بر روی ضخامت کل، ضخامت مؤثر، تغییر شکل و مقاومت پوسته Dunn و همکاران (۲۰۰۸)، جوچه‌درآوری اردک Huang و همکاران (۲۰۱۳)، اندازه مخروط‌های مامیلاری Ning و همکاران (۲۰۱۴)، اندازه بلور Dunn و همکاران (۲۰۱۲)، اینمی (Mine) (۱۹۶۷)، وزن بدن و وزن تخم مرغ (Bvanendranv، ۲۰۰۸)، می‌باشد. هم‌چنین ضخامت پوسته مؤثر بر جوچه‌درآوری شناخته شده و با توجه به ارتباط ژن اووالبومین با ضخامت پوسته، می‌تواند به طور غیر مستقیم نیز بر جوچه‌درآوری تأثیر بگذارد (Bing، ۲۰۱۴). در تحقیق حاضر نیز وزن تخم مرغ دارای ارتباط معنی‌داری با این ژن بود. این صفت با اکثر صفات کیفیت خارجی تخم مرغ ارتباط مثبت معنی‌دار خوبی به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد و برای تعیین کیفیت پوسته مناسب می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و سایر تحقیقات بر روی ژن اووالبومین، جهش‌های بدمعنی باعث تغییر در ساختار و عملکرد پروتئین شده که هتروزیگوت‌های چنین چندشکل‌هایی باعث تضعیف عملکرد موجود زنده می‌شود که به‌آسانی می‌توان افراد هتروزیگوت را با استفاده از روش انتخاب به کمک مارکر شناسایی و از جامعه حذف نمود. در این تحقیق نتیجه گرفته شد که ژن اووالبومین در نواحی مورد مطالعه دارای چندشکلی بالایی بود و ژن کاندید مهمی است که می‌تواند به عنوان نشانگری برای انتخاب به کمک مارکر برای بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ بهخصوص وزن تخم مرغ در برنامه‌های اصلاح نژادی مرغان بومی اصفهان مفید باشد.

به‌علت حضور اووالبومین در تمامی اجزاء تخم مرغ و بیان شدن آن در سرتاسر لوله تخم بر و مؤثر بودن آن در تمامی مراحل تشکیل و رشد جنین پیشنهاد می‌گردد که این ژن در رابطه با کیفیت دیگر اجزاء تخم مرغ و جوچه‌درآوری و معروفی آن به عنوان نشانگری پر اهمیت در روند انتخاب و اصلاح نژاد طیور بومی مورد بررسی قرار گیرد.



۲۵. Obeidah, A.; Merat, P. and Duradn, L., 1977. Polymorphism of egg white proteins egg weight and components weight in the Fayoumi hen. *Ann. Genet. Sel. anim.* Vol. 9, No. 3, pp: 301-306.
۲۶. Panheleux, M.; Nys, Y.; Williams, J.; Gautron, J.; Boldicke, T. and Hincke, M.T., 2000. Extraction and quantification by ELISA of eggshell organic matrix proteins (Ovocleidin-17, Ovalbumin, Ovotransferrin) in shell from young and old hens. *J. Poult. Sci.* Vol. 79, pp: 580-588.
۲۷. Radwan, L.M.; Fati, M.M.; Gala, A. and Zein El-Dein, A., 2010. Mechanical and ultrastructural properties of eggshell in two Egyptian native breeds of chicken. *Int. J. Poult. Sci.* Vol. 9, No. 1, pp: 77-81.
۲۸. Sun, C.J.; Chen, S.R.; Xu, G.Y.; Liu, X.M. and Yang, N., 2012. Global variation and uniformity of eggshell thickness for chicken eggs. *J. Poult. Sci.* Vol. 91, pp: 2718-2721.
۲۹. Sun, C.; Qu, L.; Yi, G.; Yuan, J.; Duan, Z.; Shen, M.; Qu, L.; Xu, G.; Wang, K. and Yang, N., 2015. Genome-wide association study revealed a promising region and candidate genes for eggshell quality in an F2 resource population. *BMC Genomics.* Vol. 16, pp: 565-579.
۳۰. Vilkki, J., 2007. Application of genomic approaches in egg quality research. 18th European symposium on the quality of poultry meat and 12th European symposium on the quality of eggs and egg products. Prague, Czech Republic.
۳۱. Zhang, Q.; Zhu, F.; Liu, L.; Zheng, C.W.; Wang, D.H.; Hou, Z.C. and Ning, Z.H., 2015. Integrating transcriptome and genome re-sequencing data to identify key genes and mutations affecting chicken eggshell qualities. *PLoS ONE.* Vol. 10, No. 5, pp: 1-16.
- correlated with shell thickness and are associated with eggshell matrix protein markers. *Animal Genetics.* Vol. 43, No. 4, pp: 410-418.
۱۰. Fan, Y.F.; Hou, Z.C.; Yi, G.Q.; Xu, G.Y. and Yang, N., 2013. The sodium channel gene family is specifically expressed in hen uterus and associated with eggshell quality traits. *BMC Genetics.* Vol. 14, pp: 90-100.
۱۱. Gautron, J. and Nys, Y., 2006. Eggshell matrix proteins and natural defenses of the egg. Symposium COA/INRA Scientific Cooperation in Agriculture, Tainan (Taiwan, R.O.C.). pp: 159-165.
۱۲. Gautron, J.; Mann, K.; Righetti, P.G.; Rehault Godbert, S.; Jonchere, V.; Herve Grepinet, V. and Nys, Y., 2009. Functional genomics reveals numerous novel egg proteins. 1st European Symposium on the Quality of Poultry Meat and 13th European Symposium on the Quality of Eggs and Eggs Products, Turku, Finland.
۱۳. Goto, T.; Ishikawa, A.; Yoshida, M.; Goto, N.; Umino, T.; Nishibori, M. and Tsudzuki, M., 2014. Quantitative trait loci mapping for external egg traits in F2 chickens. *J. Poult. Sci.* Vol. 51, pp: 118-129.
۱۴. Hincke, M.T.; Tsang, C.P.; Courtney, M.; Hill, V. and Narbaitz, R., 1995. Purification and immunochemistry of a soluble matrix protein of the chicken eggshell (Ovocleidin17). *Calcified Tissue International.* Vol. 56, pp: 578-583.
۱۵. Hincke, M.T. 1995. Ovalbumin is a component of the chicken eggshell matrix. *Connect Tissue Res Journal.* Vol. 31, No.3, pp: 227-33.
۱۶. Hou, Q.R.; Wang, J.Y.; Wang, H.H.; Li, Y.; Zhang, G.X. and Wei, Y., 2010. Analysis of polymorphisms in exons of the LYZ gene and effect on growth traits of Jinghai yellow chicken. *Int. J. Poult. Sci.* Vol. 9, No. 4, pp: 357-362.
۱۷. Huang, H.L.; Huang, L.T. and Cheng, Y.S., 2013. A novel SNP marker of ovalbumin gene in association with duck hatchability. *Theriogenology.* Vol. 79, pp: 1218-1223.
۱۸. Johari, S.; Ekasari, S. and Kurniant, E., 2013. Genetic variation in three breeds of Indonesian local ducks based on blood and egg white protein polymorphism. *J. Indonesian trop. Anim. agric.* Vol. 38, No. 1, pp: 20-26.
۱۹. Kinoshita, K.; Shimogiri, T.; Okamoto, S.; Kawabe, K.; Ishizuka, J.; Ibrahim, H.R. and Maeda, Y., 2003. Identification of ovalbumin phenotypes of the Asian indigenous chicken populations using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. *Animal Science Journal.* Vol. 74, pp: 355-362.
۲۰. Liu, Z.; Zheng, Q.; Zhang, X. and Lu, L., 2013. Microarray analysis of genes involved with shell strength in layer shell gland at the early stage of active calcification. *Asian-Australas. J. Anim. Sci.* Vol. 26, No. 5, pp: 609-624.
۲۱. Mahrous, M.Y.; Radwan, L.M. and El-Dlebshany, A.E., 2013. Shell quality and ultrastructural characteristics of eggshell in the 15th generation of chickens selected for egg production traits. *Egyptian J. Anim. Prod.* Vol. 50, No. 1, pp: 13-18.
۲۲. Miksik, I.; Sedlakova, P.; Lacinova, K.; Pataridis, S. and Eckhardt, A., 2010. Determination of insoluble avian eggshell matrix proteins. *Anal Bioanal Chem.* Vol. 397, pp: 205-214.
۲۳. Mine, Y., 2008. Egg Bioscience and Biotechnology. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. pp: 19-24.
۲۴. Ning, Z.; Wang, D.; Liao, B.; Zhang, Q. and Gao, Y., 2014. Polymorphisms of genes are associated with eggshell ultrastructural organization in pedigree Rhode Island White. APPC, Jeju Island, South Korea.

